

BOSULIF® bosutinib

PRESCRIPTION ET DELIVRANCE



Ce médicament est initié par **certains spécialistes hospitaliers** et renouvelé par votre **médecin hospitalier spécialiste en cancérologie, en hématologie et en oncologie médicale** (site ANSM 18/03/2015).

Il est disponible uniquement dans les **pharmacies de ville**.



Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances. Pour un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien.



Ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants dans votre poubelle. Merci de les rapporter à votre pharmacien.

Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement, veuillez lui rapporter vos boîtes et comprimés non utilisés lors du renouvellement suivant.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION

Deux présentations sont disponibles sous la forme de plaquettes thermoformées dans des boîtes de:



28 Comprimés pelliculés jaunes, ovales, dosés à **100 mg** (616 € HT)



28 Comprimés pelliculés rouges, ovales, dosés à **500 mg** (3 080 € HT).



Conservez ce médicament à une **température inférieure à 25°C**.
Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

MODE D'EMPLOI

La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. La dose habituelle est de : **500 mg 1 fois/jour**.

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



Les comprimés de BOSULIF® sont à avaler avec un **verre d'eau en une prise par jour le matin** au moment du repas. **Essayez de les prendre chaque jour à la même heure.**



Les comprimés ne doivent pas être écrasés, ni coupés ou croqués.



Le **pamplemousse** (jus, pulpe) doit être évité pendant votre traitement par BOSULIF®.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...)



N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien



Evitez les médicaments anti acides utilisés pour traiter les brûlures d'estomac en même temps que BOSULIF®. En cas de besoin, demandez conseil à votre pharmacien.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Diarrhée	Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. Surveillance des sels minéraux par analyse.	Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants.
Douleurs extrémités Symptômes cardiaques	Surveillance régulière de votre cœur (électrocardiogramme, analyses pour sels minéraux : potassium, calcium, magnésium,...) et de votre tension	Prévenez votre médecin dès l'apparition de ces signes.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Nausées et vomissements	Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).
Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires	Limitez, si possible, les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin qui pourra vous prescrire des antibiotiques.
Troubles digestifs	Un bilan hépatique et pancréatique doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin.	En cas de jaunissement de la peau ou de la partie blanche des yeux, d'urines foncées, de douleurs abdominales persistantes, prenez contact avec votre médecin.
Eruptions cutanées	Préférez un savon doux sans alcool et une crème hydratante. Evitez les expositions au soleil.	Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.
Fatigue	Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.	Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.
Maux de tête, confusions, vertiges	Mesurez régulièrement votre tension. Faites de l'exercice, contrôlez votre poids. Limitez la consommation de sel et d'alcool.	Prévenez votre médecin dès l'apparition de ces signes. Prudence en cas de conduite de véhicules ou de machines.
Œdème des membres	Elevez vos pieds quand vous êtes assis. Les vêtements serrés sont déconseillés. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel.	Surveillez régulièrement votre poids. Si prise de poids rapide et inattendue, contactez le médecin.
Des crampes musculaires et des douleurs musculaires peuvent survenir pendant le traitement.		
 Si vous ressentez des effets non mentionnés , n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur généraliste ou pharmacien.		

QUELQUES CONSEILS

Contactez rapidement le médecin en cas de :



- Douleurs à la poitrine, difficultés à respirer, toux, essoufflement.
- Prise de poids, gonflement de vos mains, chevilles, pieds.
- Apparition de selles noires, de saignements de nez et crachats comportant du sang.
- Douleurs abdominales aiguës.



Il est déconseillé de prendre BOSULIF® pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous êtes une femme vous devez utiliser une méthode contraceptive efficace et si vous êtes un homme vous devez prendre les précautions nécessaires.



N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Le **pamplemousse** (jus, pulpe) doit être évité pendant votre traitement par BOSULIF®.



Evitez les médicaments utilisés pour traiter les brûlures d'estomac (anti-acides et anti-sécrétoires).



Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de BOSULIF®, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure normale, le lendemain. Merci de le noter dans votre carnet de suivi.



Evitez l'**exposition prolongée au soleil et protégez-vous** si vous devez le faire.

REMARQUES :