# TYVERB® lapatinib

## PRESCRIPTION ET DELIVRANCE

Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier spécialiste en cancérologie**.
Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.

Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances. Pour un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien.

**Ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants dans votre poubelle**. Merci de les rapporter à votre pharmacien.
**Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement**, veuillez lui rapporter vos boîtes et comprimés non utilisés lors du renouvellement suivant.

## PRESENTATIONS ET CONSERVATION

Trois présentations sont disponibles sous la forme de boîte de 140 comprimés pelliculés jaunes (2253.12 €), boîte de 84 comprimés (1548.41 €) ou boîte de 70 comprimés (réservée à l'usage hospitalier), tous les trois dosés à 250 mg.

Conservez ce médicament à une **température inférieure à 25°C**.
**Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants**.

## MODE D'EMPLOI

La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. La dose habituelle est de :

- Soit **5 comprimés** (1250 mg) **en une prise par jour,** tous les jours en continu en association avec XELODA® (XELODA® étant pris 14 jours suivis d'un arrêt de 7 jours).
- Soit **6 comprimés** (1500 mg) **en une prise par jour,** tous les jours en continu en association avec un inhibiteur de l'aromatase.

**Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.**

Les comprimés de TYVERB® sont à avaler avec un **grand verre d'eau en une prise par jour** une heure **avant** le repas. **Essayez de les prendre chaque jour à la même heure.**
Si association avec XELODA®, prenez de préférence TYVERB® 1 heure avant le repas et XELODA®, dans les 30 minutes qui suivent le repas.

Les comprimés ne doivent ni être écrasés, ni coupés ou croqués.

Le **pamplemousse** (jus, pulpe) doit être évité pendant votre traitement par TYVERB®.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.
Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes…)

**N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.**
En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Evitez les médicaments utilisés pour traiter les brûlures d'estomac (anti-acides et anti-sécrétoires). En cas de besoin, ces médicaments doivent être pris à distance du TYVERB®. Demandez conseil à votre pharmacien.

**Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.**

| EFFETS INDESIRABLES | PREVENTION | CONDUITE A TENIR |
|---|---|---|
| **Diarrhée** | Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. | Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes…), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants. |

| EFFETS INDESIRABLES | PREVENTION | CONDUITE A TENIR |
|---|---|---|
| **Eruptions cutanées** | Préférez un savon doux sans alcool et une crème hydratante. Evitez les expositions au soleil. | Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager. |
| **Picotement, gonflement, rougeur voire douleur de la paume des mains et de la plante des pieds** | Evitez le soleil et l'eau chaude. Les vêtements et les chaussures trop serrés ne sont pas conseillés. Si possible, évitez les travaux irritants pour les mains et l'utilisation des pansements adhésifs.<br>Utilisez plutôt un savon doux sans parfum.<br>La station debout et les marches prolongées ne sont pas conseillées.<br>Une consultation chez un pédicure pourrait être utile avant et après le traitement. | Il s'agit d'un syndrome mains-pieds. Trempez les mains et les pieds dans l'eau fraîche, puis séchez sans frotter. Appliquez des crèmes hydratantes sur les zones atteintes : contactez votre médecin. |
| **Perte d'appétit** | Prenez plusieurs petites collations par jour (aliments que vous aimez), mangez lentement, buvez beaucoup. | Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique : ajouter du beurre, de l'huile, de la crème fraîche, du fromage râpé, du miel…. Demandez les conseils d'une diététicienne. En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin. |
| **Nausées et vomissements** | Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas. | Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour). |
| **Inflammation de la bouche** | Evitez les aliments acides, épicés et irritants. Utilisez une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool. | En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contactez votre médecin. |
| **Fatigue** | Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement).<br>Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée. | Soyez à l'écoute de votre corps.<br>Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin. |

**Si vous avez des problèmes au niveau du cœur, du foie ou des reins, il est nécessaire d'avertir votre médecin avant la prise.**
Une **perte de cheveux** peut survenir pendant le traitement, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin.

⚠ Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien.

## QUELQUES CONSEILS

**Contactez rapidement le médecin** en cas de :
- difficultés à respirer, toux, essoufflement ou modification du rythme respiratoire.
- éruption cutanée (urticaire – éruption surélevée avec démangeaison), gonflement des paupières, des lèvres ou de la langue
- douleurs musculaires ou articulaires
- gonflement, rougeur et douleur de la paume des mains et de la plante des pieds.

**Il est déconseillé de prendre TYVERB® pendant la grossesse et l'allaitement.**

**N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.**

**Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de TYVERB®**, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure normale, le lendemain. Merci de le noter dans votre carnet de suivi.

Evitez l'**exposition prolongée au soleil et protégez-vous** si vous devez le faire.

**REMARQUES :**

.Remerciements : - Groupe VOCC B PL : Observatoire dédié au Cancer B PL, réseaux OncoBretagne et ONCO Pays de la Loire, cliniciens, pharmaciens et infirmières d'établissements volontaires B PL, Conseils de l'Ordre B PL, Directions Régionales du Service Médical B PL, OMEDITs B PL, Cancéropôle Grand Ouest, Comité de patients et URPS B PL
- au CH Le Mans, au CH Morlaix, au CHRU Brest, à la clinique Victor Hugo du Mans, au CH St Brieuc et au Comité des patients du CHRU de Brest, à l'ICO Angers Nantes