

# ZYKADIA® céritinib

## PRESCRIPTION ET DELIVRANCE

Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier spécialiste en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie.**



Il est disponible dans les **pharmacies de ville**



**Ne jetez pas les boîtes entamées ni les gélules restantes dans votre poubelle.** Merci de les rapporter à votre pharmacien.

**Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement,** veuillez lui rapporter vos boîtes et gélules non utilisées lors du renouvellement suivant.

## PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Une présentation est disponible sous la forme de plaquettes thermoformées dans 3 boîtes de 50 gélules dosées à **150 mg** à 4 911€ TTC



Conservez ce médicament à une **température inférieure à 30°C.**  
**Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.**

## MODE D'EMPLOI

La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. La dose habituelle est de : **450 mg (3 gélules) par jour.**  
**Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.**



Les gélules de ZYKADIA® sont à avaler **avec de la nourriture, entières en une prise par jour.**  
**Essayez de les prendre chaque jour à la même heure.**



Les gélules ne doivent être ni ouvertes, ni mâchées.



Le **pamplemousse** (jus, pulpe) doit être évité pendant votre traitement par ZYKADIA®.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.  
Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...)



**N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.**  
En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien

**Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.**

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
<b>Diarrhées</b>	Si c'est un effet qui arrive souvent : évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. Surveillance des sels minéraux par analyse.	Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 diarrhées par jour).
<b>Nausées et vomissements</b>	Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
<b>Perte d'appétit</b>	Prenez plusieurs petites collations par jour (aliments que vous aimez), mangez lentement, buvez beaucoup.	Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique : ajouter du beurre, de l'huile, de la crème fraîche, du fromage râpé, du miel... Demandez les conseils d'une diététicienne. En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin.
<b>Fatigue, anémie</b>	Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.	Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.
<b>Douleurs extrémités Symptômes cardiaques</b>	Surveillance régulière de votre cœur (électrocardiogramme, analyses pour sels minéraux : potassium, calcium, magnésium,...) et de votre tension	Prévenez votre médecin dès l'apparition de ces signes.
<b>Modification du bilan sanguin</b>	Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin.	Prenez votre température en cas de doute. En cas de signes infectieux (fièvre, toux) ou de saignements inhabituels, prévenez votre médecin. Pratiquez les bilans sanguins prescrits par votre médecin.
<b>Eruptions cutanées</b>	Préférez un savon doux sans alcool et une crème hydratante. Evitez les expositions au soleil.	Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.

Des brûlures d'estomac, des troubles de la vision, une diminution du débit urinaire, peuvent survenir pendant le traitement, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin.

 Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien.

Résumé des caractéristiques du produit : 12/07/2018

QUELQUES CONSEILS	
<p><b>Contactez rapidement le médecin en cas de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>rythme cardiaque lent ou irrégulier, modification de l'activité électrique du cœur.</u></li> <li>- <u>difficultés à respirer ou respiration douloureuse, sifflements dans la poitrine au moment de la respiration, douleurs dans la poitrine en cas de respiration, fièvre.</u></li> <li>- <u>jaunissement de la peau et du blanc des yeux, nausées, perte d'appétit, urines foncées</u></li> <li>- <u>difficultés pour respirer ou avaler, gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, démangeaisons sévères</u> de la peau accompagnées d'une éruption de plaques rouges ou de petits boutons.</li> </ul> <p></p> <p> <b>N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.</b></p> <p><b>En cas d'oubli d'une prise de moins de 12 heures, prenez la dose.</b></p> <p> <b>En cas d'oubli d'une prise de plus de 12 heures, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure normale, le lendemain. Merci de le noter dans votre carnet de suivi.</b></p> <p> <b>Il est déconseillé de prendre ZYKADIA® pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous êtes une femme vous devez utiliser une <u>méthode contraceptive efficace.</u></b></p>	
<b>REMARQUES :</b>	