

# ZYTIGA® acétate d'abiratéronne

## PRESCRIPTION ET DELIVRANCE

Ce médicament vous est prescrit et sera renouvelé par votre **médecin hospitalier spécialiste en oncologie** dans le cadre de votre maladie prostatique.



Il est disponible uniquement dans les **pharmacies de ville**.



Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances et faites activer votre dossier pharmaceutique.



**Ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants dans votre poubelle.** Merci de les rapporter à votre pharmacien.

**Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement, veuillez lui rapporter vos boîtes et comprimés non utilisés lors du renouvellement suivant.**

## PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Comprimés dosés à 250 mg ovales, blancs à blanc cassé avec AA250 gravé sur une face. Boite de 120 (3 071€ HT).



Comprimés dosés à 500 mg ovales, violets, avec « AA » gravé sur une face et « 500 » gravé sur l'autre face. Boite de 60 (3 071€ HT).



Conservez ce médicament à une **température ambiante inférieure à 30°C**.  
**Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.**

## MODE D'EMPLOI

La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. La dose habituelle est de 1000 mg (soit 4 comprimés à 250 ou 2 comprimés à 500) en une seule prise par jour, en association avec prednisone ou prednisolone (dose recommandée : 5 ou 10 mg par jour).

**Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.**



Les comprimés de ZYTIGA® sont à avaler **entiers avec un grand verre d'eau en dehors des repas**.

Prenez votre médicament **au moins deux heures après le repas** et ne mangez rien pendant **au moins une heure après la prise de ZYTIGA®**.



Les comprimés ne doivent ni être écrasés, ni coupés ou croqués.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...).



**N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.**

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

**Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.**

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Brûlure urinaire ou urine trouble	Buvez, si possible, beaucoup d'eau (quantité recommandée : 1.5 litre)	Surveillez votre température. En cas de signes infectieux (fièvre, frissons, douleurs), contactez votre médecin.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
<b>Œdème des membres</b>	Elevez vos pieds quand vous êtes assis. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. Evitez les vêtements serrés.	Surveillez régulièrement votre poids. Si prise de poids rapide et inattendue, contactez le médecin.
<b>Maux de tête, palpitations, bourdonnement d'oreille</b>	Vérifiez ou faites vérifier régulièrement la tension artérielle. Faites de l'exercice, contrôlez votre poids. Limiter la consommation de sel et d'alcool.	Contactez votre médecin si ces signes surviennent ou s'amplifient. Un traitement par anti-hypertenseur vous sera prescrit si besoin.
<b>Nausées, vomissements, diarrhées, selles pâles ou grasses, douleurs abdominales, fatigue, perte d'appétit, jaunisse, démangeaisons intenses, urines foncées et douleurs musculaires.</b>	Pratiquez les bilans du foie prescrits par votre médecin.	Contactez votre médecin si ces signes surviennent. Dans certains cas, le traitement sera interrompu et les fonctions hépatiques étroitement surveillées.
 Si vous ressentez des <b>effets non mentionnés</b> , n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien. Résumé des caractéristiques du Produit du 23/07/2018.		

QUELQUES CONSEILS
<p><b>Contactez rapidement le médecin en cas de :</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- faiblesse musculaire, contractions musculaires</li> <li>- forts battements du cœur (palpitations), douleur thoracique</li> <li>- essoufflements</li> <li>- prise de poids</li> </ul> <p><b>N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.</b></p>  <p><b>Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de ZYTIGA<sup>®</sup>, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle le lendemain. Merci de le noter dans votre carnet de suivi.</b></p>  <p><b>Si vous oubliez de prendre le ZYTIGA<sup>®</sup> pendant plus d'un jour, prévenez votre médecin sans délai.</b></p> <p><b>REMARQUES :</b></p>