

	Commission Sécurisation du circuit du médicament	Page 1/53
	FICHE PRATIQUE CIRCUIT DU MÉDICAMENT	Date : Juillet 2012 Mise à jour mai 2013
VERSION N° 03	BONNES PRATIQUES D'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS PAR SONDE DE NUTRITION OU POUR LES PATIENTS AYANT DES DIFFICULTÉS À AVALER LES FORMES SOLIDES	
Préparation > bonnes pratiques d'administration des médicaments >		

I. DÉFINITION

Les médicaments concernés par cette fiche correspondent à des formes pharmaceutiques commercialisées ne permettant pas une administration par sonde de nutrition ou pour lesquelles certains patients peuvent avoir des difficultés à avaler.

II. OBJECTIFS

Proposer des pratiques de bon usage pour la préparation et l'administration de formes solides permettant une prise orale facilitée chez des patients particuliers, en tenant compte de la stabilité et de la toxicité des principes actifs et de la galénique de la spécialité commercialisée.

III. PERSONNES CONCERNÉES

Personnel soignant, IDE, pharmacien, préparateur.

IV. REFERENCES

☞ Cette liste est le résultat de la synthèse par notre groupe de travail des informations délivrées par les laboratoires pharmaceutiques et des documents suivants :

- ↘ Les bonnes pratiques d'administration OMEDIT Haute Normandie (2012)
- ↘ Du bon usage des médicaments en gériatrie. CH du Mans Pharma-Fiches V3- 2011
- ↘ Liste des médicaments administrables par sonde CH Nîmes.
- ↘ Livret d'utilisation des médicaments par voie orale, CHU Clermont-Ferrand, service pharmacie.
- ↘ Formes orales sèches et nutrition entérale par sonde naso gastrique. Fiche bon usage Omédit Région centre.
- ↘ Couper ou écraser les comprimés oui ou non ? de la théorie à la pratique. Pharmacie des HUG juin 2007.
- ↘ Liste des médicaments administrables par sonde : Hélène Poujol - Pharmacien - CHU Caremeau -Nîmes.
- ↘ Dictionnaire Vidal 2012

☞ *Cette liste n'est pas exhaustive et elle nécessitera une actualisation régulière. Elle engage la responsabilité de l'utilisateur.*

☞ *Toutes les spécialités génériques d'une DC ne sont pas présentées, le pharmacien évaluera la conduite à tenir en fonction des excipients similaires ou pas par rapport au princeps.*

☞ *Vous pouvez contacter l'OMEDIT Poitou-Charentes pour signaler toute erreur ou mise à jour.*

V. RÈGLES DE BONNES PRATIQUES

COUPER, ECRASER, OUVRIR, QUELS SONT LES RISQUES POTENTIELS ?

- **Erreur de dosage**, sur ou sous dosage.
- **Toxicité locale** avec irritation ou ulcération des muqueuses.
- Modification des propriétés physico-chimiques, pharmacocinétiques ou pharmacologiques engendrant **une toxicité, ou une perte d'effet**.

REGLES GENERALES

- En l'absence de rainure sur un comprimé, la division est aléatoire et devrait être évitée.
Il est préférable :
d'utiliser un autre dosage, une autre forme ou spécialité.
- Il ne faut pas couper, écraser, ouvrir les formes orales :
 - ✓ Gastro-résistantes (sauf pour les sondes jéjunales)
 - ✓ A libération modifiée (retard, LP, LM, Oros,), les gélules LP peuvent être ouvertes mais leur contenu non écrasé.
 - ✓ Contenant des principes actifs instables à l'air ou à la lumière.
 - ✓ A base de substances irritantes.
 - ✓ Contenant des principes actifs toxiques.
 - ✓ Contenant des substances à marge thérapeutique étroite (AVK, anticonvulsivants, digoxine).
 - ✓ Contenant un excipient huileux (capsules).

EN PRATIQUE

- Vérifier si le médicament ne peut être remplacé par une autre forme (liquide, sachet, cp effervescent, dispersible, suppositoire) ou un autre médicament.
- Vérifier si le comprimé peut être écrasé ou coupé, la gélule ouverte.
 - ✓ Sur le Vidal à la rubrique posologie.
 - ✓ Sur le guide d'utilisation des médicaments ou le livret thérapeutique.
 - ✓ En appelant la pharmacie
- Pour couper un comprimé utiliser de préférence un partage comprimé.
- Ne pas écraser les comprimés d'avance. Les principes actifs peuvent être instables à l'air, à la lumière.
- Ne pas écraser plusieurs comprimés en même temps.
- Pulvériser le plus finement possible et ajouter un volume de liquide suffisant ou un aliment pour cacher un goût désagréable.
- Laver le mortier ou le broyeur après chaque utilisation.
- Bien rincer la sonde de nutrition entérale après administration du médicament.

COUPER, ECRASER LES COMPRIMES, OUVRIR GELULES : OUI OU NON ?

POURQUOI EST-CE EVENTUELLEMENT DANGEREUX ?



- Risque de sous ou sur dosage
- Risque de toxicité locale
- Risque de modification de l'absorption (surdosage)
- Risque de destruction du médicament (perte d'effet)

REGLES GENERALES



**NE PAS
ECRASER**

- Comprimé à libération modifiée (LM, LP, retard, Oros...)
- Comprimé gastro-résistant (Sauf si administration par sonde jéjunale)
- Comprimé contenant des substances instables à l'air, la lumière
- Comprimé contenant des substances toxiques ou irritantes
- Capsule contenant un excipient huileux
- Comprimé contenant des principes actifs à marge thérapeutique étroite (Antivitamines K, anticonvulsivants, digoxine)

OU RECHERCHER L'INFORMATION ?



- Consulter le Vidal à la rubrique « POSOLOGIE »
- Consulter le livret du médicament ou un guide d'utilisation des formes orales
- Appeler la Pharmacie

EN PRATIQUE

**Vérifier si le médicament ne peut être remplacé par une autre forme (liquide, sachet, comprimé dispersible...)
ou une autre spécialité**

Vérifier si le comprimé, gélule, peut être ouvert, écrasé, coupé



Pour couper utiliser un partage comprimé



Ne pas écraser les comprimés d'avance



Broyer un seul produit à la fois



Ajouter un volume de liquide suffisant ou mélanger à un aliment pour cacher l'amertume



Laver le mortier ou le broyeur après chaque utilisation



Bien rincer la sonde de nutrition après administration

Modalités d'Administration des Médicaments sous forme solide (Gélule, comprimé, capsule...)

Légende



Ne pas écraser



écrasement possible



Ne pas ouvrir



ouverture possible



A déliter dans un verre d'eau



ne pas ouvrir



Capsule ne pas écraser

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
ABILIFY 5 mg, 10 mg et 15 mg	Aripiprazole	Comprimé		non	Aucune donnée	utiliser forme comprimé orodispersible
ABSTRAL 100 mg	Fentanyl	Comprimé sublingual		non	faire fondre le comprimé sous la langue	dispositif transdermique, spray nasal
ACTISKENAN 5 mg, 10 mg, 20 mg et 30 mg	Morphine Sulfate	Gélule		oui	ne pas écraser les granules	
ACTONEL 5 mg, 30 mg, 35 mg et 75 mg	Risédrone	Comprimé		non	30 mn avant la prise d'aliments ou de boissons (lait) . Risque d'oesophagite.	
ACUILIX 20 mg/12,5 mg	Hydrochlorothiazide + Quinapril	Comprimé pelliculé sécable		non	Aucune étude	
ACUITEL 5 mg et 20 mg	Quinapril	Comprimé enrobé sécable		non	Aucune étude	
ADALATE 10 mg	Nifédipine			non	Aucune étude. Principe actif photosensible	Nifédipine 20 mg/mL solution buvable en goutte (ATUn)
ADALATE LP 20 mg	Nifédipine	Comprimé LP		non	forme à libération prolongée	Nifédipine 20 mg/mL solution buvable en goutte (ATUn)
ADANCOR 10 mg et 20 mg	Nicorandil	Comprimé (sécable pour le 10 mg)		oui	ne pas dissoudre dans l'eau	
ADIAZINE 500 mg	Sulfadiazine	Comprimé		oui	goût amer	
ADROVANCE 70 mg/2800 UI et 70 mg/5600 UI	Acide alendronique + Cholécalciférol	Comprimé		non	Principe actif irritant pour les muqueuses. Ne pas écraser, croquer ou dissoudre dans la bouche	
ADVIL 100 mg, 200 mg et 400 mg	Ibuprofène	Comprimé enrobé		oui	goût amer, administrer immédiatement après dissolution	solution buvable 20 mg/ml, comprimé effervescent
AERIUS 5 mg	Desloratadine	Comprimé pelliculé		oui	le pelliculage masque le goût	Aerius 0,5 mg/mL solution buvable

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
AKINETON LP 4 mg	Bipéridène	Comprimé enrobé LP		non	Forme LP.	
ALDACTAZINE 25 mg/15 mg	Spironolactone + Altizide	Comprimé sécable		oui	insoluble dans l'eau, à mélanger dans du sirop ou les aliments	
ALDACTONE 25 mg, 50 mg et 75 mg	Spironolactone	Comprimé sécable		oui	insoluble dans l'eau, à mélanger dans du sirop ou les aliments	
ALDALIX 50 mg/20 mg	Furosémide + Spironolactone	Gélule		non	Aucune étude	
ALDOMET 250 mg et 500 mg	Méthyl dopa	Comprimé enrobé		oui	administrer immédiatement: Principe actif photosensible	
ALEPSAL 15 mg, 50 mg, 100 mg et 150 mg	Phénobarbital + Caféine	Comprimé		oui	très dur à écraser	
ALKERAN 2 mg	Melphalan	Comprimé pelliculé		non	Eviter d'écraser. Cytotoxique : manipuler avec précaution	
ALKONATREM 150 mg	Déméclocycline	Gélule		oui		
ALPRESS LP 2,5 mg et 5 mg	Prazosine	Comprimé osmotique LP		non	forme à libération prolongée	Minipress, Eupressyl
ALTEIS 10 mg, 20 mg et 40 mg	Olmésartan	Comprimé pelliculé		non	Pas d'étude	
AMAREL 1 mg, 2 mg, 3 mg et 4 mg	Glimépiride	Comprimé		oui		
AMLOR 5 mg et 10 mg	Amlodipine	Gélule		oui	Longue demi-vie (35 à 50 heures)	
ANAFRANIL 10 mg, 25 mg et 75 mg	Clomipramine	10 et 25 mg : Comprimé enrobé ; 75 mg : Comprimé pelliculé sécable		non	Si nécessité absolue, seules les formes 25 et 10 mg peuvent être écrasées (comprimé à 75 mg : comprimé pelliculé à matrice)	
ANANDRON 50 mg et 150 mg	Nilutamide	Comprimé		oui		

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
ANAUSIN LP 15 mg	Métoclopramide	Comprimé LP		non	Forme à libération prolongée	
ANCOTIL 500 mg	Flucytosine	Comprimé		oui		
ANDROCUR 50 mg et 100 mg	Cyprotérone Acétate	Comprimé sécable		oui		
ANSATIPINE 150 mg	Rifabutine	Gélule		oui	Ouverture des gelules juste avant administration	
AOTAL 333 mg	Acamprosate	Comprimé enrobé gastro-résistant		non	Comprimé gastro résistant, modification de la pharmacocinétique	
APRANAX 550 mg et 750 mg	Naproxène	550 mg : Comprimé pelliculé sécable ; 750 mg : Comprimé		non	Goût très amer, irritation de la gorge	Apranax sachet, granulés pour suspension buvable
APROVEL 75 mg, 150 mg et 300 mg	Irbésartan	Comprimé pelliculé		oui	Possible mais pas d'étude laboratoire	
APTIVUS 250 mg	Tipranavir	Capsule molle		non	Produit cytotoxique, contient une solution liquide et huileuse	
ARAVA 10 mg, 20 mg et 100 mg	Léflunomide	Comprimé pelliculé		non	Aucune étude, principe actif toxique et très sensible à l'humidité	
ARCALION 200 mg	Sulbutiamine	Comprimé enrobé		oui	Peut être administré en suspension après broyage	
ARESTAL 1 mg	Lopéramide	Comprimé		non	Pas d'étude	Imodium solution buvable ou lyoc
ARICEPT 5 mg et 10 mg	Donépézil	Comprimé pelliculé		oui		comprimé orodispersibles à préférer
ARIMIDEX 1 mg	Anastrozole	Comprimé pelliculé		oui	Ecrasement possible. Cytotoxique : manipulation avec précaution	
AROMASINE 25 mg	Exémestane	Comprimé enrobé		non	Pas de données	

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
ART 50 mg	Diacéérine	Gélule		non	Pas d'étude, principe actif potentiellement irritant	
ARTANE 2 mg et 5 mg	Trihexyphénidyle	Comprimé		non	Pas d'étude	Artane gouttes buvables
ARTEX 5 mg	Tertatolol	Comprimé enrobé sécable		oui	Peut être administré en suspension après broyage	
ARTHROCINE 100 mg et 200 mg	Sulindac	Comprimé (sécable pour le 200 mg)		non	Aucune étude réalisée	Autre AINS dispersibles
ARTOTEC 50 mg/0,2 mg et 75 mg/0,2 mg	Diclofénac + Misoprostol	Comprimé gastrorésistant		non	Comprimé gastrorésistant	Autre AINS
ASASANTINE LP 200 mg/25 mg	Acide acétylsalicylique + dipyridamole	Gélule LP		non	Forme à libération prolongée	Utiliser les 2 principes actifs séparément
ATACAND 4 mg, 8 mg, 16 mg et 32 mg	Candésartan	Comprimé sécable		oui		
ATARAX 25 mg et 100 mg	Hydroxyzine	Comprimé pelliculé sécable		oui	Préferer la forme sirop car goût désagréable	Atarax sirop, Bromazepam, Alprazolam
AUGMENTIN 500 mg /62.5 mg	Amoxicilline / Acide Clavulanique	Comprimé pelliculé		non	Interdit d'écraser les comprimés	Amoxicilline/Acide clavulanique sachet
AVLOCARDYL 40 mg	Propranolol	Comprimé sécable		oui		
AVLOCARDYL LP 160 mg	Propranolol	Gélule LP		oui	Résistance lors de l'ouverture Ne pas écraser les granules	
AXELER 20 mg/5 mg	Amlodipine + Olmésartan	Comprimé pelliculé		non	Association de principes actifs, à avaler tel quel	
AZADOSE 600 mg	Azithromycine	Comprimé pelliculé		oui		
AZANTAC 150 mg et 300 mg	Ranitidine	Comprimé pelliculé		oui		Préferer la forme effervescente
AZANTAC 75 mg, 150 mg et 300 mg	Ranitidine	Comprimé effervescent		oui	Administrer après dissolution	

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
BACLOFENE 10 mg	Baclofène	Comprimé		non	Aucune donnée, le comprimé broyé est à administrer sur aliment semi-solide. Ne pas dissoudre au préalable, principe actif photosensible	Liorésal 5 mg/5mL solution buvable en ATUn
BACTRIM ADULTES 80 mg/400 mg	Sulfaméthoxazole + Triméthoprim	Comprimé		oui	Goût désagréable. Préférer la forme buvable	Bactrim solution buvable
BACTRIM FORTE 160 mg/800 mg	Sulfaméthoxazole + Triméthoprim	Comprimé		oui	Goût désagréable. Préférer la forme buvable	Bactrim solution buvable
BARACLUDE 0,5 mg et 1 mg	Entécavir	Comprimé pelliculé		non	Aucune donnée	Baraclude 0,05 mg/mL solution buvable
BASDENE 25 mg	Benzylthiouracile	Comprimé				
BAYPRESS 10 mg et 20 mg	Nitrendipine	Comprimé		non	Aucune donnée	
BECILAN 250 mg	Pyridoxine	Comprimé sécable		non	Aucune donnée	
BEFIZAL 200 mg	Bézafibrate	Comprimé pelliculé		oui	Aucune étude réalisée	
BEFIZAL LP 400 mg	Bézafibrate	Comprimé enrobé LP		non	Forme à libération prolongée	Lipanthyl gé. ou Befizal comprimé
BELUSTINE 40 mg	Lomustine	Gélule		non	cytotoxique: manipulation avec précautions	
BENEMIDE 500 mg	Probénécide	Comprimé sécable		oui		
BETNESOL 0,5 mg	Bétaméthasone	Comprimé effervescent		oui	Après dissolution	
BEVITINE 250 mg	Thiamine	Comprimé enrobé		oui	Goût désagréable	
BILTRICIDE 600 mg	Praziquantel	Comprimé pelliculé quadrisécable		oui	Se désagrège dans l'eau	

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
BIPRETERAX 5 mg/1,25 mg et 10 mg/2,5 mg	Périndopril + Indapamide	Comprimé pelliculé		oui		
BIRODOGYL 1,5 M UI / 250 mg	Spiramycine + Métronidazole	Comprimé pelliculé		non	Pas d'étude	
BI-TILDIEM 90 mg et 120 mg	Diltiazem	Comprimé LP		non	Forme à libération prolongée	
BREXIN 20 mg	Piroxicam	Comprimé sécable		non	Aucune étude	Brexin comprimé effervescent
BREXIN 20 mg	Piroxicam	Comprimé effervescent		oui	Après dissolution	
BRICANYL LP 5 mg	Terbutaline	Comprimé LP		non	Forme à libération prolongée	Oxeol 10 et 20 mg, Ventoline buvable, Salbutamol suppo
BRIEM 10 mg	Bénazépril	Comprimé pelliculé		non	Modification de la biodisponibilité	Cibacene
BURINEX 1 mg et 5 mg	Bumétanide	Comprimé		oui	Administration immédiate principe actif photosensible	
BUSPIRONE 10 mg	Buspirone	Comprimé sécable		oui		
CACIT 500 mg	Calcium Carbonate	Comprimé effervescent		oui	Après dissolution	
CALCIPRAT 500 mg, 750 mg et 1000 mg	Calcium Carbonate	Comprimé à sucer ou à croquer		oui		
CALCIPRAT VITAMINE D3 500 mg/400 UI, 1000 mg/800 UI	Calcium Carbonate + Cholécalciférol	Comprimé à sucer ou à croquer		oui		
CALTRATE 600 mg	Calcium Carbonate	Comprimé pelliculé		oui		
CALTRATE VITAMINE D3 600 mg/400 UI	Calcium Carbonate + Cholécalciférol	Comprimé pelliculé		oui		
CAPTEA 50 mg/25 mg	Captopril + Hydrochlorothiazide	Comprimé sécable		oui		

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
CARBOLEVURE ADULTE	Charbon désactivé + levure déshydratée vivante	Gélule		oui		
CARDENSIEL 1,25 mg, 2,5 mg, 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg et 10 mg	Bisoprolol	Comprimé pelliculé sécable		non	Pas d'étude	
CASODEX 50 mg	Bicalutamide	Comprimé enrobé		non	Produit cytotoxique, à manipuler avec précaution. Pas d'étude	
CATAPRESSAN 0,15 mg	Clonidine	Comprimé sécable		non	Aucune étude réalisée	Autres anti HTA centraux : Aldomet, Hyperium
CEBUTID 50 mg et 100 mg	Flurbiprofène	Comprimé enrobé		non	Pas de données	
CEBUTID LP 200 mg	Flurbiprofène	Gélule LP		non	Forme LP	
CELEBREX 100 mg et 200 mg	Célécoxib	Gélule		oui		
CELECTOL 200 mg	Céliprolol	Comprimé pelliculé		oui	Ne doit pas être en contact avec la muqueuse buccale	Il existe d'autres β bloquants en solution buvable: Sectral
CELESTAMINE 0,25 mg/2 mg	Bétaméthasone + Dexchlorphéniramine	Comprimé		non	Pas de données	Celestène et Polaramine en solution buvable
CELESTENE 2 mg	Bétaméthasone	Comprimé dispersible sécable		oui	après dispersion	
CELLCEPT 250 mg	Mycophénolate mofétil	Gélule		non	Produit tératogène (masque, gants)	poudre pour susp buvable
CELLCEPT 500 mg	Mycophénolate mofétil	Comprimé		non	Produit tératogène (masque, gants)	poudre pour susp buvable
CELLTOP 25 mg et 50 mg	Étoposide	Capsule		non	Excipient irritant les muqueuses. Impossible car capsule	
CERIS 20 mg	Trospium	Comprimé enrobé		non	Goût très amer	

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
CERVOXAN 60 mg	Vinburnine	Gélule		non	Pas de données de stabilité	
CHIBRO-PROSCAR 5 mg	Finastéride	Comprimé pelliculé		oui	Pas de manipulation par la femme enceinte	
CHLORAMINOPHENE 2 mg	Chlorambucil	Gélule		non	Produit cytotoxique, ne pas ouvrir, ni écraser, ni croquer	
CHONDROSULF 400 mg	Chondroïtine Sulfate	Gélule		non	Pas de données	Chondrosulf 400 mg granulés pour suspension buvable en sachet
CHRONADALATE LP 30 mg	Nifédipine	Comprimé osmotique pelliculé LP		non	forme libération prolongée	Autres inhibiteurs calciques
CIBACENE 5 mg et 10 mg	Bénazépril	Comprimé pelliculé (sécable pour le 5 mg)		non	Pas de données	
CIFLOX 250 mg, 500 mg et 750 mg	Ciprofloxacine	Comprimé pelliculé		oui		suspension buvable
CIMETIDINE 200 mg, 400 mg et 800 mg	Cimétidine	Comprimé pelliculé		non		Comprimés effervescents
CIPRALAN 130 mg	Cibenzoline	Comprimé pelliculé sécable		non	Aucune étude réalisée	
CLAMOXYL 1g	Amoxicilline	Comprimé dispersible		oui	Après dispersion	
CLAMOXYL 500 mg	Amoxicilline	Gélule		non		suspension buvable 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml
CLARITYNE 10 mg	Loratadine	Comprimé		non		Solution buvable
CLASTOBAN 800 mg	Acide Clodronique	Comprimé		oui	Si nécessité absolue + avec de l'eau, en dehors des repas, pas de laitage	
CLERIDIUM 150 mg	Dipyridamole	Comprimé pelliculé sécable			Comprimé trop petit pour être écrasé	

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
CLOPIXOL 10 mg et 25 mg	Zuclopenthixol	Comprimé pelliculé		non	Préférer la solution buvable mélangée avec de l'eau	Solution buvable 2 %
COAPROVEL 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg et 300 mg/25 mg	Hydrochlorothiazide + Irbésartan	Comprimé pelliculé		oui		
COLCHICINE 1 mg	Colchicine	Comprimé		oui	Goût amer	
COLCHIMAX 1 mg/12,5 mg/50 mg	Colchicine + Opium + Tiémonium	Comprimé pelliculé sécable		oui		
COLTRAMYL 4 mg	Thiocolchicoside	Comprimé		oui		
COMBIVIR 150 mg/300 mg	Lamivudine + Zidovudine	Comprimé pelliculé		non	Mélanger à une petite quantité de nourriture semi-solide ou de liquide	Epivir + Retrovir solution buvable
COMTAN 200 mg	Entacapone	Comprimé pelliculé		non	Ne surtout pas dissoudre dans l'eau. Risque perte principe actif au cours du broyage	
CONCERTA LP 18 mg, 36 mg et 54 mg	Méthylphénidate	Comprimé LP		non	Forme libération prolongée	
CONTALAX 5 mg	Bisacodyl	Comprimé gastrorésistant		non	Comprimé gastrorésistant	Autres laxatifs stimulants
CONTRAMAL 50 mg	Tramadol	Gélule		oui	Contenu amer donc diluer dans aliments semi-liquides	
CONTRAMAL LP 100 mg, 150 mg et 200 mg	Tramadol	Comprimé LP		non	Forme libération prolongée	
COPEGUS 200 mg et 400 mg	Ribavirine	Comprimé pelliculé		non	Ne pas croquer	Rebetol solution buvable
CORDARONE 200 mg	Amiodarone	Comprimé sécable		oui		
CORGARD 80 mg	Nadolol	Comprimé sécable		oui		

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
CORTANCYL 1 mg, 5 mg et 20 mg	Prednisone	Comprimé (sécable pour le 20 mg)		oui	Administration extemporanée car principe actif sensible à la lumière	Autre forme orodispersible : Solupred
CORVASAL 2 mg et 4 mg	Molsidomine	Comprimé sécable (2 mg)		oui	Administration extemporanée car principe actif sensible à la lumière	
COTAREG 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg et 160 mg/25 mg	Hydrochlorothiazide + Valsartan	Comprimé pelliculé		non	Pas de données	
COUMADINE 2 mg et 5 mg	Warfarine	Comprimé sécable		oui	 Produit à marge thérapeutique étroite, attention à la dose.	
COVERAM 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg et 10 mg/10 mg	Amlodipine + Périndopril	Comprimé		oui	Peut être administré en suspension après broyage	
COVERSYL 2,5 mg, 5 mg et 10 mg	Périndopril	Comprimé pelliculé		oui		
COZAAR 50 mg et 100 mg	Losartan	Comprimé pelliculé sécable pour le 50 mg		oui	Goût amer	
CRÉON 12000 U et 25000 U	Pancréatine	Gélule gastro-résistante		oui	Ne pas écraser	
CRESTOR 5 mg, 10 mg et 20 mg	Rosuvastatine	Comprimé pelliculé		oui	Possible mais pas d'étude laboratoire	
CRIVAN 100 mg, 200 mg et 400 mg	Indinavir	Gélule		oui	Goût amer	
CYMBALTA 30 mg et 60 mg	Duloxétine	Gélule gastro-résistante		oui	Possibilité de mélanger avec de la compote ou du jus de pomme	
CYNOMEL 25 µg	Liothyronine	Comprimé sécable		oui		

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
CYSTAGON 50 et 150 mg	Mercaptamine	Gélule		oui	Eviter le mélange avec des boissons acides	
CYTOTEC 200 µg	Misoprostol	Comprimé sécable		oui	Administration immédiate avec de l'eau ou du lait	
DAFALGAN 1 g	Paracétamol	Comprimé pelliculé		non	Pas de données	Dafalgan comprimé effervescent, suppo
DAFALGAN 500 mg	Paracétamol	Gélule		oui		Préférer Effergalgan comprimé effervescent
DAFALGAN CODEINE	Codéine phosphate + Paracétamol	Comprimé pelliculé		non	Déconseillé d'écraser car très amer	Préférer Effergalgan codeine en comprimé effervescent
DAFLON 500 mg	Flavonoïdes	Comprimé pelliculé		oui	Administration immédiate avec de l'eau ou un aliment	
DALACINE 75 mg, 150 mg et 300 mg	Clindamycine	Gélule		oui		
DANTRIUM 25 mg et 100 mg	Dantrolène	Gélule		oui		
DAONIL 5 mg	Glibenclamide	Comprimé sécable		oui	prise avant le repas goût amer	
DEBRIDAT 100 mg et 200 mg	Trimébutine	Comprimé pelliculé		non	Non recommandé par le labo car absence d'étude pharmacocinétique	suppositoire à 100 mg sachet à 74,4 mg / granulés
DECONTRACTYL 500 mg	Méphénésine	Comprimé enrobé			Aucune donnée, l'enrobage masque le goût du principe actif	
DECTANCYL 0,5 mg	Dexaméthasone	Comprimé		non	adapter la posologie avec le médecin car pas la même DCI	Celestène 0,05% goutte buvable 1 comprimé = 160 gouttes = 4 ml
DELURSAN 250 mg et 500 mg	Acide Ursodésoxycholique	Comprimé pelliculé (sécable pour le 500 mg)		oui	mélanger avec de la confiture ou de la compote, goût amer	
DEPAKINE 200 mg	Valproate de Sodium	Comprimé gastrorésistant		non	comprimé gastrorésistant	solution buvable 200 mg/ml

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
DEPAKINE 500 mg	Valproate de Sodium	Comprimé gastrorésistant		non	comprimé gastroresistant	solution buvable ou Micropakine sachet
DEPAKINE CHRONO 500 mg	Valproate de Sodium	Comprimé pelliculé sécable LP		non	Sécable. Ne pas écraser/disperser dans un liquide (perte de l'effet LP)	solution buvable ou Micropakine sachet
DEPAKOTE 250 mg et 500 mg	Valproate semi-sodique	Comprimé gastrorésistant		non	comprimé gastrorésistant	
DEPAMIDE 300 mg	Valpromide	Comprimé pelliculé gastrorésistant		non	Ne pas croquer	
DEPRENYL 5 mg	Sélégiline	Comprimé sécable		oui	prise le matin	
DEROXAT 20 mg	Paroxétine	Comprimé pelliculé sécable		oui	le pelliculage masque le goût	préférer Déroxat en suspension buvable
DETENSIEL 10 mg	Bisoprolol	Comprimé pelliculé sécable		oui	Goût amer	
DEXAMBUTOL 500 mg	Ethambutol	Comprimé pelliculé		oui		
DIAMICRON LM 30 et 60 mg	Gliclazide	Comprimé à libération modifiée (sécable pour le 60 mg)		oui	Forme à libération modifiée, risque de variation important de la glycémie	Préférer l'insuline
DIAMOX 250 mg	Acétylaminide	Comprimé sécable		oui	plus aliment ou sirop de fruit pour cacher l'amertume	
DIASTABOL 50 mg et 100 mg	Miglitol	Comprimé		oui	Mettre en suspension dans un liquide après broyage	
DICETEL 50 mg et 100 mg	Pinavérium	Comprimé pelliculé		oui	Uniquement par sonde, produit abrasif sur la muqueuse oesophagienne	
DICODIN LP 60 mg	Dihydrocodéine	Comprimé LP		non	forme à libération prolongée	
DICYNONE 500 mg	Étamsylate	Comprimé		oui		préférer Dicynone inj dilué dans l'eau et administrer par voie orale

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
DIDRONEL 200 mg et 400 mg	Etidronate	Comprimé		oui		
DIFFU K 600 mg	Potassium Chlorure	Gélule		oui	éviter la prise simultanée de lait, ne pas écraser le contenu	Potassium Richard en sirop 3 % ou en sachet
DIFRAREL 100 mg	Bêta carotène + myrtille (extrait anthocyanosidique)	Comprimé enrobé		oui		
DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg	Digoxine	Comprimé sécable		non	 Produit à marge thérapeutique étroite, attention à la dose.	solution buvable 5 µg/0,1 ml,
DI-HYDAN 100 mg	Phénytoïne	Comprimé sécable		oui	déconseillé d'écraser	
DIHYDROERGOTAMINE 3 mg	Dihydroergotamine	Comprimé		non		solution buvable 2 mg/ml
DIPIPERON 40 mg	Pipampérone	Comprimé sécable		non	Aucune étude réalisée	solution buvable 40 mg/ml
DISULONE 100 mg	Dapsone + Fer oxalate	Comprimé sécable		oui	plus confiture ou yaourt	
DITROPAN 5 mg	Oxybutynine	Comprimé sécable		oui		
DOGMATIL 200 mg	Sulpiride	Comprimé sécable		non	Aucune étude réalisée	solution buvable
DOGMATIL 50 mg	Sulpiride	Gélule		non	Aucune étude réalisée	solution buvable
DOLIPRANE 500 mg	Paracétamol	Comprimé		oui	très amer	sachet, comprimé effervescent, suppositoire
DOLIPRANE 500 mg	Paracétamol	Gélule		oui	très amer	sachet, comprimé effervescent, suppositoire
DOPERGINE 0,2 mg et 0,5 mg	Lisuride	Comprimé sécable		oui	administration immédiate principe actif photosensible	

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
DUPHASTON 10 mg	Dydrogestérone	Comprimé pelliculé		oui	plus aliment administration immédiate	
DUSPATALIN 200 mg	Mébévérine	Gélule		non	Ne pas écraser les microgranules. Administration avant le repas	
EBIXA 10 mg et 20 mg	Mémantine	Comprimé pelliculé		oui	Goût amer	solution buvable 5 mg/pression
ECAZIDE 50 mg/25 mg	Captopril + Hydrochlorothiazide	Comprimé sécable		oui		
EFFERALGAN 500 mg et 1000 mg	Paracétamol	Comprimé effervescent		oui	faire dissoudre	
EFFEXOR LP 37,5 mg et 75 mg	Venlafaxine	Gélule LP		oui	Ne pas écraser les microgranules	
EFFORTIL 5 mg	Étiléfrine	Comprimé		non		Hep-a-myl oral sol buv ou effortil solution buvable 1 comprimé = 10 gouttes
EFIENT 10 mg	Prasugrel	Comprimé pelliculé		oui	goût amer, peut être mélangé avec des aliments et des liquides	
ELAVIL 25 mg	Amitryptiline	Comprimé pelliculé		non		Laroxyl sol buv (1 mg/goutte)
ELISOR 10 mg, 20 mg et 40 mg	Pravastatine	Comprimé sécable		oui		
EMEND 80 mg et 125 mg	Aprépitant	Gélule		non	la gélule doit être avalée entière	
EMTRIVA 200 mg	Emtricitabine	Gélule		non	Pas de données	Emtriva 10 mg/mL solution buvable
ENDOTELON 150 mg	Extrait de pépin de raisin	Comprimé enrobé gastro-résistant		non	Comprimé gastro-résistant	
ENDOXAN 50 mg	Cyclophosphamide	Comprimé enrobé		non	cytotoxique : manipulation avec précaution	

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
ENTOCORT 3 mg	Budénoside micronisé	Gélule de microgranules gastrorésistants		oui	ne pas écraser les granules, avec jus d'orange ou coca	
EPITOMAX 100 mg et 200 mg	Topiramate	Comprimé pelliculé		oui	Ne pas croquer, ni couper	Les gélules peuvent être ouvertes
EPITOMAX 15 mg, 25 mg et 50 mg	Topiramate	Gélule		oui	Ne pas écraser le contenu	
EPIVIR 150 mg et 300 mg	Lamivudine	Comprimé pelliculé		non	Pas de données	solution buvable 10 mg/ml
ERCEFURYL 200 mg	Nifuroxazide	Gélule		non	Goût amer	Ercefuryl oral 4 % susp buv
ERYTHROCINE 500 mg	Erythromycine	Comprimé pelliculé		oui		
ESIDREX 25 mg	Hydrochlorothiazide	Comprimé sécable		oui	goût désagréable	
ESKAZOLE 400 mg	Albendazole	Comprimé		oui	peut être mélangé à des aliments ou être mâché	
ESPERAL 500 mg	Disulfirame	Comprimé		oui		
ESTRACYT 140 mg	Estramustine	Gélule		non	cytotoxique : manipulation avec précaution	
EULEXINE 250 mg	Flutamide	Comprimé		oui		
EULEXINE 250 mg	Flutamide	Comprimé		oui		
EUPANTOL 20 mg et 40 mg	Pantoprazole	Comprimé gastrorésistant		non	comprimé gastrorésistant	Inexium, OgastOro
EUPHYLLINE L.A. 50 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg et 400 mg	Théophylline anhydre	Gélule LP		oui	Ne pas écraser le contenu	
EUPRESSYL 30 mg et 60 mg	Urapidil	Gélule		non	Pas de données	

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
EURELIX 6 mg	Pirétanide	Gélule gastro-résistante		oui	sans écraser le contenu	
EUROBIOL 25000 U	Pancréas d'origine porcine (poudre)	Gélule gastro-résistante		oui	A dissoudre dans quelque chose d'épais (pas dans du liquide)	
EUTHYRAL 20 µg/100 µg	Liothyronine sodique + Lévothyroxine sodique	Comprimé sécable		non		
EXACOR 130 mg	Cibenzoline	Comprimé pelliculé sécable		oui		
EXACYL 500 mg	Acide Traxenamique	Comprimé pelliculé		non	Pas de données	Exacyl 1 g/10 mL solution buvable
EXELON 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg, 6 mg	Rivastigmine	Gélule		non	Ne pas écraser le contenu	Exelon solution buvable 2 mg/ml
EXTRANASE 900 nK	Bromélaïnes	Comprimé enrobé gastro-résistant		non	comprimé gastro-résistant	
EZETROL 10 mg	Ezétimibe	Comprimé		non	Aucune donnée	
FAMOTIDINE 20 mg et 40 mg	Famotidine	Comprimé pelliculé		non		Inexium, Ogastoro
FANSIDAR 500 mg/25 mg	Sulfadoxine + Pyriméthamine	Comprimé quadrisécable		oui		
FARLUTAL 500 mg	Médroxyprogestérone	Comprimé		oui		
FELDENE 10 mg et 20 mg	Piroxicam	Gélule		non	A avaler telles quelles avec un grand verre d'eau	Feldene comprimé orodispersible
FEMARA 2,5 mg	Létrozole	Comprimé pelliculé		non	ne pas dissoudre, administrer de façon extemporanée sur un aliment semi- solide	
FLAGYL 250 mg et 500 mg	Métronidazole	Comprimé pelliculé		oui	goût désagréable	Flagyl suspension buvable 4 %
FLECAINE 100 mg	Flécaïnide	Comprimé sécable		oui		

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
FLECAINE LP 50 mg, 100 mg, 150 mg et 200 mg	Flécaïnide	Gélule de microgranules LP		oui	Ne pas écraser le contenu	
FLODIL LP 5 mg	Féلودipine	Comprimé enrobé LP		non	Forme LP	
FLOXYFRAL 50 mg et 100 mg	Fluvoxamine	Comprimé pelliculé		oui	principe actif irritant	
FLUCORTAC 50 µg	Fludrocortisone	Comprimé		oui	peut être dissout dans du jus de fruit ou de l'eau	
FLUDEX 2,5 mg	Indapamide	Comprimé pelliculé		oui		
FLUDEX LP 1,5 mg	Indapamide	Comprimé pelliculé LP		non	Ne pas croquer	autre diurétique hypokaliémiant, Lasilix, Esidrex
FLUVERMAL 100 mg	Flubendazole	Comprimé		oui		Fluvermal oral 20 mg/ml solution buvable
FOLINORAL 5 mg et 25 mg	Calcium folinate	Gélule		oui		
FORTZAAR 100 mg/12,5 mg et 100 mg/25 mg	Hydrochlorothiazide + Losartan	Comprimé		non	Aucune info, le principe actif est soluble dans l'eau et n'est pas photosensible	
FOSAMAX 10 mg et 70 mg	Acide Alendronique	Comprimé		non	principe actif très irritant pour la muqueuse	
FOSAVANCE 70 mg/2800 UI et 70 mg/5600 UI	Acide alendronique + Cholécalciférol	Comprimé		non	principe actif irritant pour les muqueuses	
FOZITEC 10 mg et 20 mg	Fosinopril	Comprimé (sécable pour le 10 mg)		oui		
FUCIDINE 250 mg	Acide fusidique	Comprimé		oui	principe actif amer, administration immédiate	Préférer Fucidine enfant 250 mg/5ml suspension buvable
FUMAFER 66 mg	Fumarate ferreux	Comprimé pelliculé		oui		Fumafer pdre orale 33 mg/1 g de poudre orale

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
FURADANTINE 50 mg	Nitrofurantoïne	Gélule		oui		Furadantine 5 mg/mL solution buvable en ATUn
GABACET 400 mg	Piracétam	Gélule		non	Ne pas ouvrir, ni croquer	Gabacet solution buvable en ampoule
GARDENAL 10 mg, 50 mg et 100 mg	Phénobarbital	Comprimé		oui		Kaneuron 5,4 % solution buvable
GLIBENESE 5 mg	Glipizide	Comprimé sécable		oui		
GLIVEC 100 mg et 400 mg	Imatinib	Comprimé pelliculé		non	Cytotoxique: manipulation avec précaution Possibilité de disperser dans de l'eau ou du jus de pomme (50 ml pour un comprimé à 100 mg et 200 ml pour un comprimé à 400 mg) Administration extemporanée après désagrégation	
GLUCOPHAGE 500 mg, 850 mg et 1000 mg	Metformine	Comprimé pelliculé (sécable pour le 1000 mg)		oui		poudre pour susp buvable en sachet-dose
GLUCOR 50 mg et 100 mg	Acarbose	Comprimé (sécable pour le 100 mg)		oui		
GRISEFULINE 250 mg et 500 mg	Griséofulvine	Comprimé sécable		oui	peut être mélangé à un aliment liquide	
GUTRON 2,5 mg	Midodrine	Comprimé		oui	Non recommandé par le labo car absence d'étude pharmacocinétique. principe actif photosensible.	
GYNERGENE CAFEINE	Caféine + Ergotamine tartrate	Comprimé		non	Aucune étude	préférer forme suppo
HALDOL 1 mg et 5 mg	Halopéridol	Comprimé		non	principe actif photosensible	Haldol solution buvable
HALFAN 250 mg	Halofantrine	Comprimé sécable		non	Pas de données	Halfan suspension buvable (1 c mesure = 100 mg)
HAVLANE 1 mg	Loprazolam	Comprimé sécable		oui		

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
HEMI-DAONIL 2,5 mg	Glibenclamide	Comprimé sécable		oui		
HEMIGOXINE NATIVELE 0,125 mg	Digoxine	Comprimé		non	 Produit à marge thérapeutique étroite, attention à la dose.	solution buvable 5 µg/0,1 ml
HEPSERA 10 mg	Adéfovir	Comprimé		oui	Administration par sonde après dissolution en raison du goût désagréable	
HEPT-A-MYL 187,8 mg	Heptaminol	Comprimé		non	Aucune donnée	Hept-a-myl solution buvable (1 comprimé = 15 gouttes)
HEXAQUINE 120 mg/32 mg	Quinine + Thiamine	Comprimé enrobé		oui		Hexaquine suppos
HEXASTAT 100 mg	Altrétamine	Gélule		non	cytotoxique: manipulation avec précaution	port de gants, de masque si ouverture
HYDERGINE 4,5 mg	Dihydroergotamine	Comprimé sécable		non	Pas de données	Hydergine 1 mg/mL solution buvable
HYDREA 500 mg	Hydroxycarbamide	Gélule		non	Cytotoxique: manipulation avec précaution. Certains excipients persistent en surface	port de gants, de masque si ouverture
HYDROCORTISONE ROUSSEL 10 mg	Hydrocortisone	Comprimé sécable		oui		
HYPERIUM 1 mg	Rilménidine	Comprimé		oui		
HYTACAND 8 mg et 16 mg	Candésartan Cilexétel + Hydrochlorothiazide	Comprimé		oui	Association de principes actifs	
HYZAAR 50 mg/12,5 mg	Hydrochlorothiazide + Losartan	Comprimé pelliculé		non	Aucune étude.	
ICAZ LP 2,5 mg et 5 mg	Isradipine	Gélule LP		non	Ne pas écraser le contenu.	autre IC: amlodipine gélule
IDARAC 200 mg	Floctafénine	Comprimé sécable		oui	Possibilité de le délayer dans l'eau	

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
IKOREL 10 mg et 20 mg	Nicorandil	Comprimé (sécable pour le 10 mg)		oui	Ne pas ouvrir la plaquette au niveau de la bande de couleur (contient des comprimés déshydratants)	
IMIGRANE 50 mg	Sumatriptan	Comprimé pelliculé		non	Aucune étude réalisée Goût désagréable ou amer	solution pour pulvérisation nasale
IMODIUM 2 mg	Lopéramide	Gélule		non		Imodium solution buvable
IMOVANE 3,75 mg et 7,5 mg	Zopiclone	Comprimé pelliculé (sécable pour le 7,5 mg)		oui	principe actif photosensible, goût amer.	
IMUREL 25 mg et 50 mg	Azathioprine	Comprimé pelliculé		non	cytotoxique: manipulation avec précaution. Ne pas écraser ni croquer.	port de gants, de masque si broyage
INDOCID 25 mg	Indométacine	Gélule		non		forme suppo
INEXIUM 20 mg et 40 mg	Ésoméprazole	Comprimé gastrorésistant		oui	Ne pas croquer. Possibilité de disperser le comprimé dans un peu d'eau.	Préférer les granulés 10 mg pour suspension buvable sachet
INIPOMP 20 mg et 40 mg	Pantoprazole	Comprimé gastrorésistant		non	Forme gastrorésistante	Préférer Inexium 10 mg granulés pour suspension buvable
INSPIRA 25 mg et 50 mg	Eplérénone	Comprimé pelliculé		non	Aucune donnée	
INVIRASE 200 mg	Saquinavir mésilate	Gélule		oui		
INVIRASE 500 mg	Saquinavir mésilate	Comprimé pelliculé		oui	Ne pas croquer.	
IPERTEN 10 mg et 20 mg	Manidipine	Comprimé		non	Aucune étude	
ISOPRINOSINE 500 mg	Inosine acédobène dimépranol	Comprimé sécable		oui		
ISOPTINE 40 mg	Vérapamil	Comprimé enrobé		oui		

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
ISOPTINE 120 mg	Vérapamil	Gélule		oui		
ISOPTINE LP 240 mg	Vérapamil	Comprimé pelliculé sécable		non	forme à libération prolongée	Isoptine gé1 120 mg ou comprimé 40 mg
ISORYTHM LP 125 mg et 250 mg	Disopyramide	Gélule LP		oui	ne pas écraser les granules	
IXEL 25 mg et 50 mg	Milnacipran	Gélule		oui		
IXPRIM 37,5 mg/325 mg	Paracétamol + Tramadol	Comprimé pelliculé		oui	Aucune étude.	Comprimés effervescents
IZILOX 400 mg	Moxifloxacine	Comprimé pelliculé		non	principe actif photosensible	
JANUVIA 25 mg, 50 mg et 100 mg	Sitagliptine	Comprimé pelliculé		non	Aucune donnée donc non recommandé	
JOSIR LP 0,4 mg	Tamsulosine	Gélule de microgranules LP		oui	ne pas écraser les granules	
KALEORID LP 600 mg et 1000 mg	Potassium Chlorure	Comprimé LP		non	forme à libération prolongée	sirop de potassium
KALETRA 100 mg/25 mg et 200 mg/50 mg	Lopinavir + Ritonavir	Comprimé pelliculé		non	Ne pas mâcher, couper, broyer.	Kaletra 80 mg/20 mg solution buvable
KEAL 1 g	Sucralfate	Comprimé sécable		non	Aucune donnée	Keal 1 g et 2 g suspension buvable
KEFORAL 500 mg, 1g	Céfalexine	Comprimé pelliculé		non	Aucune donnée	Keforal poudre pour solution buvable
KEPPRA 250 mg, 500 mg et 1000 mg	Lévétiracétam	Comprimé pelliculé			Goût amer	Keppra 100 mg/mL solution buvable
KERLONE 20 mg	Bétaxolol	Comprimé pelliculé sécable		oui		
KETEK 400 mg	Télithromycine	Comprimé pelliculé		oui	Goût très amer	
KIVEXA 600 mg/300 mg	Abacavir + Lamivudine	Comprimé pelliculé		non	Ne pas croquer ni écraser	

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
KREDEX 6,25 mg, 12,5 mg et 25 mg	Carvédilol	Comprimé sécable		non	avaler au moment des repas pour éviter la survenue d'hypotension orthostatique	
KYTRIL 1 mg et 2 mg	Granisétron	Comprimé pelliculé		non	Aucune étude	
LAMALINE	Caféine + Opium poudre + Paracétamol	Gélule		oui	Impossible car présence de poudre d'opium	Lamaline suppositoire
LAMICTAL 2 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg et 200 mg	Lamotrigine	Comprimé à croquer / dispersible		oui	dispenser le comprimé dans un peu d'eau	
LAMISIL 250 mg	Terbinafine	Comprimé sécable		oui	principe actif photosensible, risque de modification de la biodisponibilité	comprimé orodispersible
LAMPRENE 50 mg et 100 mg	Clofazimine	Capsule		non	contenu liquide huileux	
LANVIS 40 mg	Tioguanine	Comprimé sécable		non	cytotoxique: manipulation avec précautions	
LARGACTIL 25 mg et 100 mg	Chlorpromazine	Comprimé pelliculé sécable		non	principe actif photosensible.	Largactil solution buvable 25 mg/5 ml, 4 %
LARIAM 250 mg	Méfloquine	Comprimé sécable		oui	principe actif amer, irritant. Utilisation extemporanée	
LAROXYL 25 mg et 50 mg	Amitriptyline	Comprimé pelliculé		non	Aucune étude	Laroxyl oral 4 % solution buvable
LASILIX 20 mg et 40 mg	Furosémide	Comprimé (sécable pour le 40 mg)		oui	principe actif photosensible	solution buvable 10 mg/ml
LASILIX RETARD 60 mg	Furosémide	Gélule LP		oui	ne pas écraser les granules	préférer forme comprimé
LASILIX SPECIAL 500 mg	Furosémide	Comprimé sécable		oui	ne pas écraser les granules	préférer forme comprimé
LEDERFOLINE 5 mg, 15 mg et 25 mg	Calcium folinate	Comprimé (sécable pour le 15 mg)		oui	A diluer dans l'eau, ne pas mélanger avec d'autres produits.	

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
LEPONEX 25 mg et 100 mg	Clozapine	Comprimé sécable		non	Ecrasement possible mais pas de dissolution dans l'eau	
LEPTICUR 10 mg	Tropatépine	Comprimé		oui		
LERCAN 10 mg et 20 mg	Lercanidipine	Comprimé pelliculé (sécable pour le 10 mg)		non	Pas de données	
LESCOL 20 mg et 40 mg	Fluvastatine	Gélule		non	Pas de données	Autres statines
LESCOL LP 80 mg	Fluvastatine	Comprimé pelliculé LP		non	Forme LP	Autres statines
LEVOTHYROX 25 µg, 50 µg, 75 µg, 100 µg, 125 µg, 150 µg et 200 µg	Lévothyroxine	Comprimé		oui	La prise concomitante d'aliments diminue l'absorption	L-Thyroxine solution buvable
LEXOMIL 6 mg	Bromazépam	Comprimé quadrisécable		oui		
LIORÉSAL 10 mg	Baclofène	Comprimé sécable		non	Aucune donnée, le comprimé broyé est à administrer sur aliment semi-solide. Ne pas dissoudre au préalable, principe actif photosensible	Liorésal 5 mg/5mL solution buvable en ATUn
LIPANTHYL 145 mg et 160 mg	Fénofibrate	Comprimé pelliculé		oui	peu soluble	
LIPANTHYL micronisé 67, 200 mg	Fénofibrate	Gélule		oui	Ne pas écraser le contenu	
LODOZ 2,5 mg/6,25 mg, 5 mg/6,25 mg et 10 mg/6,25 mg	Bisoprolol + Hydrochlorothiazide	Comprimé pelliculé		non	Déconseillé en raison du pelliculage	
LOGIMAX 5 mg/47,5 mg	Féلودipine + Métoprolol	Comprimé enrobé LP		non	forme retard	
LOPRESSOR 100 mg	Métoprolol	Comprimé pelliculé sécable		oui	Le pelliculage n'est pas en faveur de l'écrasement, mais pas de données l'interdisant	

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
LOPRESSOR LP 200 mg	Métoprolol	Comprimé sécable LP		non	Impossible car forme retard	
LOPRIL 25 mg et 50 mg	Captopril	Comprimé sécable		oui		
LOXAPAC 25 mg, 50 mg et 100 mg	Loxapine	Comprimé pelliculé		non	Modification de leur action pharmacocinétique et thérapeutique	Loxapac oral 1mg/goutte solution buvable
LOXEN 20 mg	Nicardipine	Comprimé sécable		oui	principe actif photosensible	
LOXEN LP 50 mg	Nicardipine	Gélule LP		oui	ne pas écraser les granules	
LUDIOMIL 25 mg et 75 mg	Maprotiline	Comprimé pelliculé (sécable pour le 25 mg)		oui	Risque de modification de la biodisponibilité	
LUTENYL 3,75 mg et 5 mg	Nomégestrol	Comprimé		oui		
LYRICA 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg et 300 mg	Prégabaline	Gélule		non	Pas de données	
LYSANXIA 10 mg et 40 mg	Prazépam	Comprimé (sécable pour le 40 mg)		oui	à déliter	préférer Lysanxia goutte buvable
LYSODREN 500 mg	Mitotane	Comprimé		non	Produit cytotoxique	
LYTOS 520 mg	Acide Clodronique	Comprimé pelliculé		non	Avec de l'eau, en dehors des repas, pas de laitage	
MAG 2 100 mg	Magnésium	Comprimé		non		sachet buvable
MALOCIDE 50 mg	Pyriméthamine	Comprimé		oui		
MANTADIX 100 mg	Amantadine	Capsule molle		non	impossible car contenu pâteux	
MEDROL 100 mg	Méthylprednisolone	Comprimé		oui	administrer après dispersion dans de l'eau	préférer anti-inflammatoire stéroïdien soluble type Solupred

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
MEDROL 4 mg et 16 mg	Méthylprednisolone	Comprimé sécable		non	Aucune étude	préférer anti-inflammatoire stéroïdien soluble type Solupred
MEGACE 160 mg	Mégésterol acétate	Comprimé		non	cytotoxique: manipulation avec précaution	
MELADININE 10 mg	Méthoxsalène	Comprimé		oui		
MENAEELLE 100 mg	Progestérone	Capsule		non	excipient huileux	solution injectable IM, capsules vaginales
MESTINON 60 mg	Pyridostigmine	Comprimé enrobé		oui		
MESTINON RETARD 180 mg	Pyridostigmine	Comprimé LP		oui	Forme retard	
METEOSPASMYL	Alvérine + Siméticone	Capsule molle		non	L'alvérine est un produit anesthésiant donc risque de fausse route	
METHERGIN 0,125 mg	Méthylergométrine	Comprimé pelliculé		non	Aucune étude	
METHOTREXATE 2,5 mg	Méthotrexate	Comprimé		non	Produit cytotoxique	
METOPIRONE 250 mg	Métyrapone	Capsule		non	contenu liquide huileux	
MIANSERINE 10 mg, 30 mg et 60 mg	Miansérine	Comprimé pelliculé		oui	Utiliser rapidement, effet anesthésique de contact	
MICROPAKINE LP 100 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg et 1000 mg	Acide valproïque + Valproate de sodium	Granulés LP en sachets		non	forme à libération prolongée/microgranules de petite taille	solution buvable Dépakine 200mg/mL
MINI-SINTROM 1 mg	Acénocoumarol	Comprimé		oui	 Attention comprimé très petit, médicament à marge thérapeutique étroite	
MIOREL 4 mg	Thiocolchicoside	Gélule		oui		

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
MOBIC 7,5 mg et 15 mg	Méloxicam	Comprimé (sécable pour le 15 mg)		non	Aucune étude, se délite facilement dans la bouche	
MOCLAMINE 150 mg	Moclobémide	Comprimé pelliculé sécable		oui		
MODAMIDE 5 mg	Amiloride	Comprimé		oui		
MODIODAL 100 mg	Modafinil	Comprimé		non	Non recommandé par le labo, absence d'étude	
MODOPAR 125 Dispersible 100 mg/25 mg	Lévodopa + Bensérazide	Comprimé sécable pour solution buvable		oui	à dissoudre dans boisson	
MODOPAR 62,5 (50 mg/12,5 mg), 125 (100 mg/25 mg) et 250 (200 mg/50 mg)	Lévodopa + Bensérazide	Gélule		non	avaler la gélule entière, sans la croquer, ni l'ouvrir	Modopar comprimé dispersible
MODOPAR LP 125 (100 mg/25 mg)	Lévodopa + Bensérazide	Gélule LP		non	forme à libération prolongée	Modopar comprimé dispersible
MODURETIC 5 mg/50 mg	Amiloride + Hydrochlorothiazide	Comprimé sécable		oui	goût désagréable	
MOGADON 5 mg	Nitrazépam	Comprimé sécable		oui	Pas d'étude de stabilité, risque d'échauffement lors de l'écrasement	
MOLSIDOMINE 2 mg et 4 mg	Molsidomine	Comprimé		oui		
MONICOR LP 20 mg, 40 mg et 60 mg	Isosorbide mononitrate	Gélule LP		oui	ne pas écraser les microgranules qui sont à libération prolongée	
MONOTILDIEM LP 200 mg et 300 mg	Diltiazem Chlorhydrate	Gélule LP		oui	ne pas écraser les microgranules qui sont gastrorésistants, vérifier que l'intégralité des microgranules a été absorbée	Autres inhibiteurs calciques
MONOZECLAR 500 mg	Clarithromycine	Comprimé pelliculé LM		non	Impossible car forme à libération modifiée	

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
MOPRAL 20 mg	Oméprazole	Gélule		oui	ne pas écraser les granules gastrorésistantes	Risque d'obstruction de la sonde. Préférer IPP forme orodispersible
MOSCONTIN 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg et 200 mg	Morphine Sulfate	Comprimé enrobé LP		non	forme à libération prolongée	SkenanLP sans écraser les granules
MOTILIUM 10 mg	Dompéridone	Comprimé pelliculé		non	Possibilité d'écraser les comprimés si administration par SNG	Préférer la forme buvable ou les granulés effervescents
MUXOL 30 mg	Ambroxol	Comprimé		oui		Muxol 0,3 % solution buvable
MYFORTIC 180 mg et 360 mg	Mycophénolate sodique	Comprimé pelliculé gastrorésistant		non	Forme gastrorésistante	
MYLERAN 2 mg	Busulfan	Comprimé pelliculé		non	cytotoxique: manipulation avec précaution	
MYNOCINE 50 mg et 100 mg	Mynocycline	Gélule		oui		
MYSOLINE 250 mg	Primidone	Comprimé sécable		oui		
MYTELASE 10 mg	Ambénonium	Comprimé sécable		oui		
NABUCOX 500 mg	Nabumétone	Comprimé pelliculé		non	Pas de données	Nabucox 1 g comprimé dispersible
NAFTILUX 200 mg	Naftidrofuryl	Gélule		non	Les gélules sont à libération modifiée	
NAPROSYNE 250 mg, 500 mg, et 1000 mg	Naproxène	Comprimé		non	Aucune étude	Naprozyne suppo
NARAMIG 2,5 mg	Naratriptan	Comprimé pelliculé		non	Pas de données	
NATULAN 50 mg	Procarbazine	Gélule		non	cytotoxique: manipulation avec précaution	
NAVELBINE 20 mg et 30 mg	Vinorelbine	Capsule molle		non	Cytotoxique	

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
NEO-MERCAZOLE 5 mg et 20 mg	Carbimazole	Comprimé		oui	peu soluble dans l'eau	
NEORAL 10 mg, 25 mg, 50 mg et 100 mg	Ciclosporine	Capsule		non	excipient huileux. Ne pas avaler avec du jus de pamplemousse	Neoral sol buv 100 mg/ml Fl 50 ml
NEULEPTIL 10 mg	Propériciazine	Gélule		non	principe actif très photosensible	Neuleptil 4 % solution buvable 30 ml
NEULEPTIL 25 mg	Propériciazine	Comprimé pelliculé sécable		non	principe actif photosensible	Neuleptil 4 % solution buvable 30 ml
NEURONTIN 100 mg, 300 mg et 400 mg	Gabapentine	Gélule		oui	Le labo ne le recommande pas, mais le précédent RCP le permettait et conseillait de mélanger le contenu avec l'alimentation pour masquer l'amertume du principe actif	Neurontin 250 mg/5 mL solution buvable en ATUn
NEURONTIN 600 mg et 800 mg	Gabapentine	Comprimé pelliculé sécable		non	Pas de données	Neurontin 250 mg/5 mL solution buvable en ATUn
NICOBION 500 mg	Nicotinamide	Comprimé pelliculé		oui	Goût amer	
NIDREL 10 mg	Nitrendipine	Comprimé		oui	ne pas écraser à l'avance	
NIFLURIL 250 mg	Acide niflumique	Gélule		oui	goût désagréable	préférer Nifluril suppo, indocid goutte
NIFUROXAZIDE 200 mg	Nifuroxazide	Gélule		non		solution buvable 4 %
NILEVAR 10 mg	Noréthandolone	Comprimé sécable		non	Aucune donnée sur la biodisponibilité	
NIMOTOP 30 mg	Nimodipine	Comprimé pelliculé		non	principe actif photosensible, administration immédiate, éviter le contact avec du PVC	
NISIS 40 mg, 80 mg et 160 mg	Valsartan	Comprimé pelliculé sécable		non	Aucune étude	

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
NISISCO 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg et 160 mg/25 mg	Valsartan + Hydrochlorothiazide	Comprimé pelliculé		non	Aucune étude	
NIVAQUINE 100 mg	Chloroquine	Comprimé sécable		oui		forme sirop ou lariam oral comprimé 250 mg
NIZORAL 200 mg	Kétoconazole	Comprimé		non	Aucune étude. ATU	
NOCERTONE 60 mg	Oxétorone	Comprimé pelliculé sécable		non	Pas de données	
NOCTAMIDE 1 mg et 2 mg	Lormétazépam	Comprimé sécable		oui		
NOLVADEX 10 mg et 20 mg	Tamoxifène	Comprimé pelliculé (enrobé pour le 20 mg)		oui	cytotoxique : manipulation avec précaution.	
NOOTROPYL 800 mg	Piracétam	Comprimé pelliculé		oui		Nootropyl injectable ou buvable 20 %
NORDAZ 7,5 mg et 15 mg	Nordazépam	Comprimé sécable		oui	principe actif insoluble dans l'eau	
NOROXINE 400 mg	Norfloxacine	Comprimé enrobé		oui		
NORSET 15 mg	Mirtazapine	Comprimé pelliculé		non	Ecrasement possible mais principe actif amer	Norset suspension buvable
NORVIR 100 mg	Ritonavir	Comprimé pelliculé		non	Ne pas mâcher, ni écraser, ni couper.	Norvir 80 mg/ml solution buvable
NOTEZINE 100 mg	Diéthylcarbamazine	Comprimé sécable		oui		
NOVATREX 2,5 mg	Méthotrexate	Comprimé		non	cytotoxique: manipulation avec précaution	
NOVONORM 0,5 mg, 1 mg et 2 mg	Réplaglinide	Comprimé		oui		Adapter la posologie,
NOZINAN 25 mg et 100 mg	Lévomépromazine	Comprimé pelliculé sécable		non	Aucune étude	Nozinan oral 4 % solution buvable

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
ODRIK 0,5 mg, 2 mg et 4 mg	Trandolapril	Gélule		non	Pas de données	
OFLOCET 200 mg	Ofloxacin	Comprimé pelliculé sécable		oui	administration immédiate principe actif photosensible	
OGAST 15 mg et 30 mg	Lansoprazole	Gélule gastro-résistante		oui	Ne pas écraser les microgranules	Préférer comprimés dispersibles (Ogastoro)
OGASTORO 15 mg et 30 mg	Lansoprazole	Comprimé orodispersible		oui		
OMIX LP 0,4 mg	Tamsulosine	Gélule de microgranules LP		oui	Ne pas écraser les microgranules	
ORACEFAL 500 mg	Céfadroxil	Gélule		non	Pas de données	Oracéfal 1 g comprimé dispersible, Oracéfal poudre pour suspension buvable
ORACILLINE 1 M UI	Phénoxy-méthyl-pénicilline	Comprimé sécable		non	Aucune donnée	Oracilline 0,25 MUI suspension buvable
ORAP 1 mg et 4 mg	Pimozide	Comprimé		oui		
ORBENINE 500 mg	Cloxacilline	Gélule		non	Aucune étude, plus d'alternative sirop	
ORELOX 100 mg	Cefpodoxime proxétile	Comprimé pelliculé		non	goût désagréable	Forme pédiatrique solution buvable
OROKEN 200 mg	Céfixime	Comprimé pelliculé		oui		poudre pour susp buvable 40 mg/5 ml (nourrisson) ou 100 mg/5 ml (enfant)
OXEOL 10 mg et 20 mg	Bambutérol	Comprimé sécable		oui		
OXYCONTIN LP 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg et 120 mg	Oxycodone	Comprimé pelliculé LP		non	forme à libération prolongée	

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
OXYNORM 5 mg, 10 mg et 20 mg	Oxycodone	Gélule		non	Pas de données	Oxynorm 10 mg/mL solution buvable et Oxynormoro comprimé orodispersible
OZIDIA LP 5 mg et 10 mg	Glipizide	Comprimé LP		non	forme à libération prolongée	
PALUDRINE 100 mg	Proguanil	Comprimé sécable		oui	très amer, administration immédiate	
PARIET 10 mg et 20 mg	Rabéprazole	Comprimé gastro-résistant		non	comprimé gastro-résistant mais comprimé très petit. Ne pas croquer+ ni écraser.	Autre IPP orodispersibles
PARKINANE LP 2 mg et 5 mg	Trihexyphénidyle	Gélule LP		oui	Ne pas écraser les microgranules	Artane oral solution buvable 0,4 % 0,1 mg/goutte
PARLODEL 2,5 mg	Bromocriptine	Comprimé sécable		non	Pas de données laboratoire	
PARLODEL 5 mg et 10 mg	Bromocriptine	Gélule		oui	Pas de données	
PEFLACINE 400 mg	Péfloxacine	Comprimé pelliculé sécable		oui	principe actif photosensible, le pelliculage sert à masquer l'amertume	
PENTASA 500 mg et 1 g	Mésalazine	Comprimé		non	comprimé avec enrobage libération contrôlée. Forme sachet peut être administrée par sonde naso gastrique	Granules sachets, susp rectale selon indication
PENTOXIFYLLINE LP 400 mg	Pentoxifylline	Comprimé pelliculé LP		non	forme à libération prolongée	Autre antiischémique: buflo médil
PERIACTINE 4 mg	Cyproheptadine	Comprimé		oui		
PERINDOPRIL 2 mg, 4 mg et 8 mg	Périndopril	Comprimé		oui		
PERMIXON 160 mg	Serenoa repens (extrait)	Gélule		oui	goût désagréable	
PERSANTINE 75 mg	Dipyridamole	Comprimé enrobé		non	goût désagréable et fort pouvoir colorant.	

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
PHENERGAN 25 mg	Prométhazine	Comprimé enrobé		non	Pas de données	Phénergan 0,1 % sirop
PHYSIOTENS 0,2 mg et 0,4 mg	Moxonidine	Comprimé pelliculé		oui	Goût très amer	
PIPRAM FORT 400 mg	Acide pipémidique	Comprimé enrobé		oui		
PIRILENE 500 mg	Pyrazinamide	Comprimé sécable		oui		
PLAQUENIL 200 mg	Hydroxychloroquine	Comprimé pelliculé		non	Très forte amertume du principe actif	
PLAVIX 75 mg et 300 mg	Clopidogrel	Comprimé pelliculé		oui	goût amer	
PLITICAN	Alizapride	Comprimé sécable		non	Aucune étude	
PNEUMOREL 80 mg	Fenspiride	Comprimé enrobé		non	Impossible car forme considérée comme LP (comprimé dragéifié)	Pneumorel suspension buvable 0,2 %
POLARAMINE 2 mg	Dexchlorphéniramine	Comprimé sécable		non		Polaramine oral 0,5 mg/5 ml sirop
PONSTYL 250 mg	Acide méfénamique	Gélule		non	Pas d'étude.	
PRADAXA 75 mg, 110 mg et 150 mg	Dabigatran	Gélule		non	pourrait augmenter le risque de saignement	
PRAXILENE 100 mg	Naftidrofuryl	Gélule		non	irritant pour l'œsophage	
PRAXILENE 200 mg	Naftidrofuryl	Comprimé pelliculé		non	irritant pour l'œsophage	
PRAXINOR	Cafédrine + Théodrenaline	Comprimé pelliculé		non	Il n'est pas possible de broyer les comprimés (pelliculage)	
PRAZINIL 50 mg	Carpipramine	Comprimé pelliculé		non	Pas d'étude.	

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
PRESTOLE 50 mg/25 mg	Hydrochlorothiazide + Triamterène	Gélule		oui	Aucune donnée, diluer la poudre dans l'eau	
PRETERAX 2 mg/0,625 mg	Périndopril + Indapamide	Comprimé pelliculé		oui	Peut être administré en suspension après broyage	
PREVISCAN 20 mg	Fluindione	Comprimé quadrisécable		oui	 Produit à marge thérapeutique étroite, attention à la dose.	Porter attention à la précision de la dose
PREZISTA 75 mg, 150 mg, 300 mg, 400 mg et 600 mg	Darunavir	Comprimé pelliculé		non	Pas de données	
PRIMALAN 5 mg et 10 mg	Méquitazine	Comprimé sécable		non	Risque de modification de la biodisponibilité	Primalan sirop
PRIMPERAN 10 mg	Métoclopramide	Comprimé sécable		oui		Primperan solution buvable 2,6 mg/ml (enf+nourr), 0,1 % (adulte)
PRITOR 20 mg, 40 mg et 80 mg	Telmisartan	Comprimé		non	principe actif sensible à l'air et à l'humidité donc le broyage est source d'altération	Autres sartans
PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg, 80 mg/12,5 mg et 80 mg/25 mg	Telmisartan + Hydrochlorothiazide	Comprimé		non	principe actif sensible à l'air et à l'humidité donc le broyage est source d'altération	Autres sartans
PROCORALAN 5 mg et 7,5 mg	Ivabradine	Comprimé pelliculé		oui	Dissolution possible après broyage sauf dans du jus de pamplemousse	
PROFENID 50 mg	Kétoprofène	Gélule		non	principe actif photosensible	Profenid suppo ou autre AINS
PROFENID 100 mg	Kétoprofène	Comprimé pelliculé		non	principe actif photosensible	Profenid suppo ou autre AINS
PROFENID LP 200 mg	Kétoprofène	Gélule LP		oui	Ne pas écraser les microgranules principe actif photosensible	Profenid suppo ou autre AINS

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
PROFENID LP 200 mg	Kétoprofène	Comprimé enrobé LP		oui	principe actif photosensible	Profenid suppo ou autre AINS
PROGLICEM 25 mg et 100 mg	Diazoxide	Gélule		oui		
PROGRAF 0,5 mg, 1 mg et 5 mg	Tacrolimus	Gélule		oui		
PROPYLEX 50 mg	Propylthiouracile	Comprimé		oui		
PROTHIADEN 25 mg	Dosulépine	Gélule		oui		
PROTHIADEN 75 mg	Dosulépine	Comprimé enrobé		oui		
PROZAC 20 mg	Fluoxétine	Gélule		oui		Fluoxetine solution buvable, comprimé dispersible
PROZAC 20 mg	Fluoxétine	Comprimé dispersible sécable		oui		Prozac solution buvable 20 mg/5 ml, comprimés dispersibles sécables
PROZAC 20 mg	Fluoxétine	Gélule		oui		Prozac solution buvable 20 mg/5 ml, comprimés dispersibles sécables
PURINETHOL 50 mg	Mercaptopurine	Comprimé sécable		non	cytotoxique: manipulation avec précaution	
PYOSTACINE 250 mg et 500 mg	Pristinamycine	Comprimé pelliculé (sécable pour le 500 mg)		oui	goût amer	
QUINIMAX 125 mg et 500 mg	Quinine, Quinidine, Cinchonine, Cinchonidine	Comprimé pelliculé sécable		oui		
RANIPLEX 75 mg, 150 mg et 300 mg	Ranitidine	Comprimé		non	principe actif photosensible	comprimé effervescent
RANITIDINE 75 mg, 150 mg et 300 mg	Ranitidine	Comprimé pelliculé		non	principe actif photosensible	comprimé effervescent
RAPAMUNE 0,5 mg, 1 mg et 2 mg	Sirolimus	Comprimé enrobé		non	Ne pas avaler avec du jus de pamplemousse	solution buvable 1mg/mL

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
RASILEZ 150 mg et 300 mg	Aliskirène	Comprimé pelliculé		non	ne pas dissoudre, administrer de façon extemporanée sur un aliment semi- solide, goût amer	
REBETOL 200 mg	Ribavirine	Gélule		non	principe actif cytotoxique	Solution buvable 40 mg/mL
RELPAX 20 mg et 40 mg	Elétriptan	Comprimé pelliculé		non	Pas de données	
REMINYL 4 mg, 8 mg et 12 mg	Galantamine	Comprimé pelliculé		non	Aucune donnée	Reminyl 4 mg/mL solution buvable
REMINYL LP 8 mg, 16 mg et 24 mg	Galantamine	Gélule LP		oui	Aucune donnée	Reminyl 4 mg/mL solution buvable
RENITEC 5 mg et 20 mg	Énalapril	Comprimé sécable		non	dégradation du principe actif en milieu acide. principe actif hygroscopique et photosensible	
REQUIP 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg et 5 mg	Ropinirole	Comprimé pelliculé		non	Pas d'étude.	
REQUIP LP 2 mg, 4 mg et 8 mg	Ropinirole	Comprimé pelliculé LP		non	Forme LP.	
RETROVIR 100 mg et 250 mg	Zidovudine	Gélule		non	Ne pas croquer, ni écraser	Retrovir solution buvable 10 mg/ml
RETROVIR 300 mg	Zidovudine	Comprimé pelliculé		non	Ne pas croquer, ni écraser	Retrovir solution buvable 10 mg/ml
REVATIO 20 mg	Sildénafil	Comprimé pelliculé		oui	Eviter le jus de pamplemousse	Revatio poudre pour suspension buvable 10 mg/mL
REVIA 50 mg	Naltrexone	Comprimé pelliculé sécable		non		
REVLIMID 5 mg, 10 mg, 15 mg et 25 mg	Lénalidomide	Gélule		non	principe actif cytotoxique	
REYATAZ 150 mg, 200 mg et 300 mg	Atazanavir	Gélule		non	Pas de données de stabilité, principe actif peu soluble dans l'eau	

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
RHINADVIL	Ibuprofène + Pseudoéphédrine	Comprimé enrobé		oui	Temps d'absorption diminué, le principe actif a un goût très piquant	
RIFADINE 300 mg	Rifampicine	Gélule		oui		Rifadine suspension buvable
RIFATER 120 mg / 50 mg / 300 mg	Isoniazide + Pyrazinamide + Rifampicine	Comprimé enrobé		oui	Goût amer	
RIFINAH 300 mg / 150 mg	Isoniazide + Rifampicine	Comprimé enrobé		oui		
RILUTEK 50 mg	Riluzole	Comprimé pelliculé		non	Pas de données	
RIMIFON 50 mg et 150 mg	Isoniazide	Comprimé		oui		
RISORDAN 20 mg	Isosorbide dinitrate	Comprimé sécable		non		
RISPERDAL 1 mg, 2 mg et 4 mg	Rispéridone	Comprimé pelliculé sécable		non	Goût amer	sol buv 1 mg/ml ou comprimé orodispersible
RITALINE 10 mg	Méthylphénidate	Comprimé		oui	Aucune donnée mais broyage possible	
RITALINE LP 10 mg, 20 mg, 30 mg et 40 mg	Méthylphénidate	Gélule LP		oui	Ne pas écraser le contenu, ne pas disperser sur des aliments chauds	
RIVOTRIL 2 mg	Clonazépam	Comprimé quadrisécable		non	Aucune étude	Rivotril solution buvable à 2,5 mg/ml
ROCALTROL 0,25 µg	Calcitriol	Capsule molle		non		
RODOGYL	Métronidazole + Spiramycine	Comprimé pelliculé		oui	Aucune étude	
ROVALCYTE 450 mg	Valganciclovir	Comprimé pelliculé		non	Ne pas croquer, produit carcinogène et tératogène	Rovalcyte 50 mg/mL poudre pour solution buvable
ROVAMYCINE 1,5 M UI et 3 M UI	Spiramycine	Comprimé pelliculé		non	Aucune étude	Rovamycine granulé 1,5M UI sachet

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
ROWASA 250 mg et 500 mg	Mésalazine	Comprimé enrobé gastro-résistant		non	Forme gastro-résistante empêchant la destruction du principe actif dans l'estomac	Forme suppo, Pentasa granulés en sachet
RULID 100 mg et 150 mg	Roxithromycine	Comprimé pelliculé pour le 100 mg et enrobé pour le 150 mg		non	Pas d'étude, goût désagréable	Rulid oral 50 mg comprimé pour suspension buvable
RYTHMODAN 100 mg	Disopyramide	Gélule		non	Pas d'étude	
RYTHMODAN LP 250 mg	Disopyramide	Comprimé enrobé LP		non	Aucune étude	forme non LP ou Isorythm LP gél
RYTHMOL 300 mg	Propafénone	Comprimé pelliculé sécable		oui		
SABRIL 500 mg	Vigabatrine	Comprimé pelliculé sécable		non	Avalés entiers ou par demi-comprimé, avec au moins un demi verre d'eau	Sabril sachet 500 mg
SALAZOPYRINE 500 mg	Sulfasalazine	Comprimé enrobé gastro-résistant		non	comprimé gastro-résistant	Pentasa oral 500 mg seulement si maladie de crohn
SALBUMOL 2 mg	Salbutamol	Comprimé		non	Aucune étude	salbutamol suppo
SANDIMUM 25 mg, 50 mg et 100 mg	Ciclosporine	Capsule molle		non	Impossible car capsule molle	Sandimum solution buvable 100 mg/ml
SANMIGRAN 0,5 mg	Pizotifène	Comprimé enrobé		non	Pas de données	
SAVARINE 200 mg/100 mg	Chloroquine + Proguanil	Comprimé pelliculé		non	Pas de données, le pelliculage masque le goût amer du principe actif	
SECTRAL 200 mg et 400 mg	Acébutolol	Comprimé pelliculé		non	préférer la solution buvable	Sectral oral 40 mg/ml suspension buvable
SECTRAL LP 500 mg	Acébutolol	Comprimé pelliculé LP		non	Aucune donnée. Administration extemporanée. Goût désagréable	Sectral oral 40 mg/ml suspension buvable
SEGLOR 5 mg	Dihydroergotamine	Gélule		non	Pas de données	Dihydroergotamine solution buvable 2 mg/mL

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
SELOKEN 100 mg	Métoprolol	Comprimé sécable		oui		
SELOKEN LP 200 mg	Métoprolol	Comprimé LP		non	forme à libération prolongée	
SELOZOK LP 23,75 mg, 95 mg et 190 mg	Métoprolol	Comprimé pelliculé LP (sécable pour le 23,75 mg)		non	forme à libération prolongée	
SEMAP 20 mg	Penfluridol	Comprimé		non	Pas de données	
SERC 8 mg	Bétahistine	Comprimé		oui	Aucune étude	
SERECOR LP 300 mg	Hydroquinidine	Gélule LP		oui	ne pas écraser les microgranules	
SERESTA 10 mg et 50 mg	Oxazépam	Comprimé (sécable pour le 50 mg)		oui		
SERMION 5 mg et 10 mg	Nicergoline	Gélule		oui		Sermion lyoc
SEROPLEX 5 mg, 10 mg, 15 mg et 20 mg	Escitalopram	Comprimé pelliculé sécable (sauf pour le 5 mg)		oui		Seroplex 20 mg/mL solution buvable
SEROPRAM 20 mg	Citalopram Bromhydrate	Comprimé pelliculé sécable		oui	goût amer	Seropram 40 mg/mL solution buvable
SERTRALINE 25 mg et 50 mg	Sertraline	Gélule		non	Aucune donnée donc non recommandé	
SEVREDOL 10 mg et 20 mg	Morphine Sulfate	Comprimé pelliculé sécable		non	A avaler tels quels avec une petite quantité de boisson	Actiskenan gél, morphine buvable amp
SIBELIUM 10 mg	Flunarizine	Comprimé sécable		non	Aucune donnée donc non recommandé	
SIFROL 0,18 mg et 0,7 mg	Pramipexole	Comprimé		non	Pas de donnée sur la cinétique et l'efficacité	
SIFROL LP 0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg, 2,1 mg	Pramipexole	Comprimé LP		non	Forme LP	

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
SINEMET 100 mg/10 mg et 250 mg/25 mg	Carbidopa + Lévodopa	Comprimé sécable		non	Aucune étude, avaler sans mâcher ni écraser	
SINEMET LP 100 mg/25 mg et 200 mg/50 mg	Carbidopa + Lévodopa	Comprimé LP		non	Ne pas croquer	forme non LP
SINGULAIR 10 mg	Montélukast	Comprimé pelliculé		non	Pas de données	Singulair 4 mg et 5 mg comprimé à croquer, et Singulair 4 mg granulés en sachets
SINTROM 4 mg	Acénocoumarol	Comprimé quadrisécable		non	Produit à marge thérapeutique étroite, attention à la dose.	Utiliser minisintrom 1 mg comprimé (plus petit)
SKENAN LP 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg et 200 mg	Morphine Sulfate	Gélule de microgranules LP		oui	sonde de taille suffisante/ ne pas écraser les microrgranules/ bien rincer la sonde	solution buvable de morphine
SOLIAN 100 mg, 200 mg et 400 mg	Amilsupride	Comprimé sécable (pelliculé pour le 400 mg)		non	Ne pas croquer, ni macher	Préferer la solution buvable 100 mg/ml
SOLUPRED 5 mg et 20 mg	Prednisolone	Comprimé effervescent		oui	dissoudre le comprimé	Existe en orodispersible
SOPHIDONE LP 4 mg, 8 mg, 16 mg et 24 mg	Hydromorphone	Gélule LP		oui	forme à LP, ne pas écraser les granules	
SORIATANE 10 mg et 25 mg	Acitrétine	Gélule		oui	principe actif très photosensible, administration dans la seconde suivant l'ouverture	
SOTALLEX 80 mg et 160 mg	Sotalol	Comprimé sécable		oui		
SPASFON 80 mg	Phloroglucinol + Triméthylphloroglucinol	Comprimé enrobé		non	goût amer	forme lyoc
SPASFON LYOC 80 mg	Phloroglucinol	Lyophilisat oral		oui	à dissoudre dans l'eau ou à faire fondre sous la langue	
SPECIAFOLDINE 0,4 mg et 5 mg	Acide folique	Comprimé		oui		

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
SPORANOX 100 mg	Itraconazole	Gélule		non	risque de colmatage des sondes	Sporanox en solution buvable pour les sondes
STABLON 12,5 mg	Tianeptine	Comprimé enrobé		oui		
STAGID 700 mg	Metformine	Comprimé sécable		oui	Goût amer	
STALEVO tous dosages	Carbidopa + Entacapone + Lévodopa	Comprimé pelliculé		Non	Ecrasement non recommandé sauf en tout dernier recours. Administration extemporanée avec un aliment semi-solide mais dans ce cas il y a perte de principe actif	
STILNOX 10 mg	Zolpidem	Comprimé pelliculé sécable		oui	principe actif photosensible, le pelliculage protège de la lumière, administrer immédiatement	
STROMEKTOL 3 mg	Ivermectine	Comprimé		oui		
SUBUTEX 0,4 mg, 2 mg et 8 mg	Buprénorphine	Comprimé sublingual		non	Laisser fondre sous la langue	
SULFARLEM 12,5 mg et S25 mg	Anétholtrithione	Comprimé enrobé		non	Aucune étude	
SURBRONC AMBROXOL 30 mg	Ambroxol	Comprimé sécable expectorant		non	Aucune étude	Ambroxol solution buvable
SURGAM 100 mg et 200 mg	Acide Tiaprofénique	Comprimé sécable		oui	Avaler tel quel ou dissout dans l'eau, ne pas prendre à jeun	
SURMONTIL 25 mg et 100 mg	Trimipramine	Comprimé (pelliculé sécable pour le 100 mg)		non	Aucune étude	Surmontil 4 % solution buvable
SUSTIVA 50 mg, 100 mg et 200 mg	Efavirenz	Gélule		non	Aucune étude	solution buvable 30 mg/ml
SUSTIVA 600 mg	Efavirenz	Comprimé pelliculé		non	Aucune donnée	solution buvable 30 mg/ml
SYNEDIL 50 mg	Sulpiride	Gélule		non	Aucune étude	solution buvable

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
SYNEDIL FORT 200 mg	Sulpiride	Comprimé		non	Aucune étude	solution buvable
TADENAN 50 mg	Prunier d'Afrique extrait	Capsule molle		non	excipient huileux	
TAHOR 10 mg, 20 mg, 40 mg et 80 mg	Atorvastatine	Comprimé pelliculé		oui		
TAMIFLU 30 mg, 45 mg et 75 mg	Oséltamivir	Gélule		oui		granulés pour suspension buvable 12 mg/ml
TAMOXIFENE 10 mg et 20 mg	Tamoxifène	Comprimé pelliculé (sécable pour le 20 mg)		non	cytotoxique : manipulation avec précaution.	
TANAKAN 40 mg	Extrait de Ginko biloba	Comprimé enrobé		non	Pas de données	Tanakan 40 mg/mL solution buvable
TANGANIL 500 mg	Acétylleucine	Comprimé		oui		
TARCEVA 25 mg, 100 mg et 150 mg	Erlotinib	Comprimé pelliculé		non	Aucune donnée pharmacocinétique	
TARDYFERON 80 mg	Sulfate ferreux	Comprimé enrobé		non	Formulation spécifique pour une absorption au niveau duodénal et proximal du jéjunum	Fumafer pdre oral 33 mg/1g
TARDYFERON B9	Acide folique + Sulfate ferreux	Comprimé pelliculé		non	Formulation spécifique pour une absorption au niveau duodénal et proximal du jéjunum	Fumafer pdre oral 33 mg/1g
TAREG 40 mg, 80 mg et 160 mg	Valsartan	Comprimé pelliculé sécable		non	ne pas dissoudre, administrer de façon extemporanée sur un aliment semi-solide	
TARKA LP 180 mg/2 mg	Trandolapril + Vérapamil	Comprimé pelliculé LP		non	Forme LP	
TAVANIC 500 mg	Lévofloxacine	Comprimé pelliculé sécable		oui	principe actif photosensible	
TEGRETOL 200 mg	Carbamazépine	Comprimé sécable		non		forme suspension buvable 20 mg/ml

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
TEGRETOL LP 200 mg et 400 mg	Carbamazépine	Comprimé pelliculé sécable LP		non	forme à libération prolongée	forme suspension buvable 20 mg/ml
TEMESTA 1 mg et 2,5 mg	Lorazépam	Comprimé sécable		oui		
TEMGESIC 0,2 mg	Buprénorphine	Comprimé sublingual		non	faire fondre le comprimé sous la langue	
TEMODAL 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg et 250 mg	Témozolomide	Gélule		non	cytotoxique: manipulation avec précaution	
TENORDATE	Aténolol + Nifédipine	Gélule		non	Renferme de la poudre d'aténolol et un comprimé LP de nifédipine qui ne doivent pas être détériorés	
TENORETIC 50 mg/12,5 mg	Aténolol + Chlortalidone	Comprimé pelliculé sécable		oui	Aucune étude, administration en suspension après écrasement	
TENORMINE 50 mg et 100 mg	Aténolol	50 mg : Comprimé pelliculé sécable ; 100 mg : Comprimé enrobé sécable		oui		
TENSTATEN 50 mg	Ciclétanine	Gélule		oui		
TERALITHE 250 mg	Lithium	Comprimé sécable		non	Aucune étude réalisée	préférer Neurolithium amp buvable
TERALITHE LP 400 mg	Lithium	Comprimé sécable LP		non	forme à libération prolongée	
TERCIAN 25 mg et 100 mg	Cyamémazine	Comprimé		non	Pas lieu de les écraser car il existe une solution alternative par la solution buvable	Tercian oral 40 mg/ml solution buvable
THALIDOMIDE 50 mg	Thalidomide	Gélule		non	principe actif cytotoxique	
THEOSTAT LP 100 mg, 200 mg et 300 mg	Théophylline	Comprimé sécable LP		non	Ne pas écraser, ne pas croquer	

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
THERALENE 5 mg	Alimémazine	Comprime pelliculé sécable		oui	Ecrasement possible car pelliculage non gastrorésistant	Théralène 0,05 % sirop ou 4 % solution buvable en goutte
TIAPRIDAL 100 mg	Tiapride	Comprimé sécable		oui		Solution buvable 5 mg/goutte
TIBERAL 500 mg	Ornidazole	Comprimé		oui		Flagyl oral 4 % suspension buvable (sur avis et prescription médicale)
TICLID 250 mg	Ticlopidine	Comprimé pelliculé		oui	Administration immédiate car photosensible	
TILCOTIL 20 mg	Ténoxicam	Comprimé pelliculé sécable		non	principe actif instable à l'oxydation	Tilcotil 20 mg suppo
TILDIEM 60 mg	Diltiazem	Comprimé		non	Ne pas croquer	Autres inhibiteurs calciques: Nifédipine solution buvable, Amlodipine, Isoptine
TIORFAN 100 mg	Racécadotril	Gélule		oui	Goût désagréable	Poudre orale en sachets
TIORFANOR 175 mg	Racécadotril	Comprimé pelliculé		non	Goût désagréable	Poudre orale en sachets et gél pouvant être ouvertes
TOFRANIL 10 mg et 25 mg	Imipramine	Comprimé enrobé		non	Pas de données	
TOPALGIC 50 mg	Tramadol	Gélule		oui		
TOPALGIC LP 100 mg, 150 mg et 200 mg	Tramadol	Comprimé LP		non	forme à libération prolongée	Topalgic oral 50 mg gelule
TRACLEER 62,5 mg et 125 mg	Bosentan	Comprimé pelliculé		oui	Administration sous forme de suspension, il n'est pas nécessaire d'écraser les comprimés au préalable	Tracleer 32 mg comprimé dispersible
TRANDATE 200 mg	Labétalol	Comprimé pelliculé		oui		
TRANXENE 5 mg, 10 mg et 20 mg	Clorzébate	Gélule		oui		préférer Lysanxia solution buvable sauf indication tétanos

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
TREDEMINE 500 mg	Niclosamide	Comprimé à croquer		oui	à avaler avec très peu d'eau pour atteindre l'estomac sous forme solide	
TRENTADIL 300 mg	Bamifylline	Comprimé enrobé		oui	goût amer	Euphylline oral, forme suppo
TRIA TEC 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg et 10 mg	Ramipril	Comprimé sécable (sauf pour le 1,25 mg)		non	Aucune étude donc non recommandé	
TRIFLUCAN 50 mg, 100 mg et 200 mg	Fluconazole	Gélule		oui	Administration avec des aliments semi solides possible	Solution buvable 50 mg/5ml et 200 mg/5ml
TRILEPTAL 150 mg, 300 mg et 600 mg	Oxcarbazépine	Comprimé pelliculé		oui		Trileptal solution buvable 60 mg/ml
TRINITRINE 0,15 mg	Trinitrine	Pilule enrobée		oui	croquer lentement	dispositifs transdermiques
TRIVASTAL 20 mg	Piribédil	Comprimé enrobé		oui		
TRIVASTAL LP 50 mg	Piribédil	Comprimé enrobé LP		non	forme à libération prolongée	
TRIZIVIR 300 mg/150 mg/300 mg	Abacavir + Lamivudine + Zidovudine	Comprimé pelliculé		non	Pas de données	
TROLOVOL 300 mg	Pénicillamine	Comprimé pelliculé		oui		
TRUVADA 200 mg/245 mg	Emtricitabine + Ténofovir	Comprimé pelliculé		oui	Le comprimé peut être délité dans de l'eau, du jus d'orange ou de raisin et administré immédiatement.	
UBITEN 10 mg et 50 mg	Décorenone	Gélule		oui	ATU	Ubiten solution buvable 50 mg/10 mL
UFT 100 mg/224 mg	Tégafur + Uracile	Gélule		non	cytotoxique: manipulation avec précaution	
ULTRA-LEVURE 50 mg et 200 mg	Saccharomyces boulardii	Gélule		oui	CI si cathéter central (dispersion des spores), goût amer et odeur désagréable	Ultra-levure poudre pour suspension buvable en sachets

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
UN-ALFA 0,25 µg, 0,5 µg et 1 µg	Alfacalcidol	Capsule molle		non	excipient huileux	Un -alfa solution buvable 0,1 µg/goutte
URBANYL 10 mg et 20 mg	Clobazam	Comprimé (sécable pour le 10 mg)		non	Aucune étude, le Clozabam est peu soluble dans l'eau	
URBANYL 5 mg	Clobazam	Gélule		non	Aucune étude, le Clozabam est peu soluble dans l'eau	
UROMITEXAN 400 mg et 600 mg	Mesna	Comprimé pelliculé sécable		non	Aucune étude réalisée. Ampoule par voie injectable peuvent être avalées	forme injectable
UTROGESTAN 100 mg et 200 mg	Progestérone	Capsule molle		non	Suspension en phase huileuse	
VADILEX 20 mg	Ifenprodil	Comprimé pelliculé		non	Pas de données	
VALDOXAN 25 mg	Agomélatine	Comprimé pelliculé		oui	Peut être administré en suspension après broyage	
VALIUM 2 mg, 5 mg et 10 mg	Diazépam	Comprimé sécable		non	Aucune étude	Valium 1 % solution buvable
VASTAREL 20 mg	Trimétazidine	Comprimé pelliculé		non		Vastarel solution buvable 20 mg/mL
VASTAREL 35 mg	Trimétazidine	Comprimé pelliculé à libération modifiée		non	Comprimé à libération modifiée	Vastarel solution buvable 20 mg/mL
VASTEN 10 mg, 20 mg et 50 mg	Pravastatine	Comprimé sécable (sauf pour le 40 mg)		oui		
VECTARION 50 mg	Almitrine	Comprimé pelliculé sécable		oui	Peut être administré en suspension après broyage	
VFEND 50 mg et 200 mg	Voriconazole	Comprimé pelliculé		non	Pas de données	Vfend 40 mg/mL poudre pour suspension buvable
VIBRAMYCINE N 100 mg	Doxycycline	Comprimé sécable		oui	bien agiter après la dispersion du comprimé dans l'eau	
VIDEX 125 mg, 200 mg, 250 mg et 400 mg	Didanosine	Gélule gastrorésistante		non	La stabilité des gélules gastrorésistantes n'a pas été étudiée	Videx 2 g, poudre pour solution buvable

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
VIDEX 25 mg, 50 mg, 100 mg et 150 mg	Didanosine	Comprimé à croquer / dispersible		oui	mâcher les comprimés ou les disperser dans de l'eau	Videx 2 g, poudre pour solution buvable
VIRAMUNE 200 mg	Névirapine	Comprimé		non	Ne pas croquer	Viramune 50 mg/5 ml suspension buvable
VIRAMUNE LP 100 mg et 400 mg	Névirapine	Comprimé LP		non	Forme LP	Viramune 50 mg/5 ml suspension buvable
VIREAD 245 mg	Ténofovir	Comprimé pelliculé		oui	A déliter dans au moins 100 mL d'eau, jus d'orange ou de raisin	
VISCERALGINE 50 mg	Tiémonium	Comprimé pelliculé		non	Pas de données	Autres antispasmodiques : Spasfon Iyoc, Débridat suspension buvable
VISKEN 5 mg et 15 mg	Pindolol	Comprimé (sécable pour le 15 mg)		oui	Aucune donnée	
VITAMINE B1 B6	Pyridoxine + Thiamine	Comprimé pelliculé		non	Aucune donnée, goût amer et odeur désagréable, principe actif photosensible	
VITAMINE B12 250 µg	Cyanocobalamine	Comprimé sécable		non	Pas d'étude, principe actif photosensible	Vitamine B12 1 mg/2 mL solution buvable en ampoule
VOGALENE 15 mg	Métopimazine	Gélule		non	Aucune étude	Vogalène 0,1 % solution buvable, Vogalène 0,4 % solution buvable, Vogalène 5 mg suppo, Vogalène Lyoc 7,5 mg
VOGALENE LYOC 7,5 mg	Métopimazine	Lyophilisat oral		oui	Dispersible dans l'eau et dans la bouche, ne pas croquer	
VOLTARENE 25 mg et 50 mg	Diclofénac	Comprimé enrobé gastro-résistant		non		Voltaire 100 mg suppo, autres AINS
VOLTARENE LP 75 mg et 100 mg	Diclofénac	Comprimé enrobé LP		non	Forme LP	Voltaire 100 mg suppo, autres AINS
XANAX 0,25 mg, 0,5 mg et 1 mg	Alprazolam	Comprimé sécable		oui		

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
XATRAL 2,5 mg	Alfuzosine	Comprimé pelliculé		oui	Pelliculage opaque protège le principe actif et masque amertume	
XATRAL LP 10 mg	Alfuzosine	Comprimé LP		non	forme à libération prolongée	
XELODA 150 mg et 500 mg	Capécitabine	Comprimé pelliculé		non	Produit cytotoxique	
XENAZINE 25 mg	Tétrabénazine	Comprimé sécable		oui	Préparation à faire extemporanément	
XYZALL 5 mg	Lévocétirizine	Comprimé pelliculé		oui		
ZADITEN 1 mg	Kétotifène	Gélule		non	Pas de données	Zaditen 1 mg/5 mL solution buvable
ZADITEN LP 2 mg	Kétotifène	Comprimé pelliculé LP		non	Forme LP	Zaditen 1 mg/5 mL solution buvable
ZAMUDOL LP 50 mg, 100 mg, 150 mg et 200 mg	Tramadol	Gélule LP		oui	ne pas écraser les microgranules	Tramadol 50 mg à libération immédiate, Orozamidol 50 mg comprimé orodispersible
ZECLAR 250 mg et 500 mg	Clarithromycine	Comprimé pelliculé		oui	Goût amer	Zeclar 25 mg/mL et 50 mg/mL granulés pour suspension buvable
ZEFFIX 100 mg	Lamivudine	Comprimé pelliculé		non	Pas de données	Zeffix 5mg/ml solution buvable 240 ml
ZELITREX 500 mg	Valaciclovir	Comprimé pelliculé		non	Pas lieu de les écraser car il existe une solution alternative par la solution buvable	Zovirax suspension buvable
ZENTEL 400 mg	Albendazole	Comprimé		non	Aucune étude	Zentel 0,4 g/10 mL suspension buvable
ZERIT 20 mg, 30 mg et 40 mg	Stavudine	Gélule		oui	ouvrir avec précaution et mélanger avec aliments	Zerit 200 mg poudre pour susp buvable

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
ZESTORETIC 20 mg/12,5 mg	Hydrochlorothiazide + Lisinopril	Comprimé sécable		oui	Possible mais non recommandé car aucune étude. Comprimé difficile à écraser	
ZESTRIL 5 mg et 20 mg	Lisinopril	Comprimé (sécable pour le 5 mg)		oui	Aucune étude, comprimé difficile à écraser.	
ZIAGEN 300 mg	Abacavir	Comprimé pelliculé		oui		Ziagen 20 mg/mL solution buvable
ZINNAT 125 mg et 250 mg	Céfuroxime	Comprimé pelliculé		non	Déconseillé car principe actif amer et libération spécifique	Zinnat 125 mg/5 mL granulés pour suspension buvable en sachets
ZITHROMAX 250 mg	Azithromycine	Comprimé pelliculé		non	principe actif photosensible, aucune étude	Zithromax 40 mg/mL poudre pour suspension buvable
ZOCOR 5 mg, 20 mg et 40 mg	Simvastatine	Comprimé pelliculé (sécable pour le 20 mg)		non	Pas d'étude. Excipient irritant les muqueuses	Autre statine
ZOLOFT 25 mg et 50 mg	Sertraline	Gélule		non	Aucune donnée	
ZOMIG 2,5 mg	Zolmitriptan	Comprimé pelliculé		non	Aucune donnée	Préférer la forme Zomig ORO 2,5 mg comprimé orodispersible
ZOPHREN 4 mg et 8 mg	Ondansétron	Comprimé pelliculé		non	Aucune donnée. Goût amer	Zophren lyophilisat oral ou sirop
ZOPHREN 4 mg et 8 mg	Ondansétron	Lyophilisat oral		oui	Laisser fondre sous la langue	après dissolution dans l'eau ou sirop à 4 mg/5 ml
ZOVIRAX 200 mg et 800 mg	Aciclovir	Comprimé		non	Interdit d'écraser	solution buvable 200 mg/5 ml
ZOXAN LP 4 mg et 8 mg	Doxazosine mésilate	Comprimé LP		non	forme à libération prolongée	
ZYLORIC 100 mg, 200 mg et 300 mg	Allopurinol	Comprimé		oui	avec boisson ou aliment	
ZYPREXA 5 mg, 7,5 mg et 10 mg	Olanzapine	Comprimé enrobé		non	ne pas croquer	Zyprexa velotab 5 mg, 10 mg, 15 mg et 20 mg comprimé orodispersible

SPECIALITES	DCI	Forme galénique	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
ZYPREXA VELOTAB 5 mg, 10 mg, 15 mg et 20 mg	Olanzapine	Comprimé orodispersible		oui	orodispersible, doit être dissous dans eau, lait, café, jus de pommes ou jus orange	
ZYRTECSET 10 mg	Cétirizine	Comprimé pelliculé sécable		non	Aucune donnée	Zyrtec 10 mg/mL solution buvable
ZYVOXID 600 mg	Linézolide	Comprimé pelliculé		non	Pas de données	Zyvoxid 100 mg/5mL granulés pour suspension buvable