

FICHE PATIENTS

Elaboration de la fiche :



Mise à jour :



DAKLINZA®

(DACLASTAVIR)

30 OU 60 MG COMPRIME

Traitement VHC

Version en vigueur

Date d'application
Janvier 2015

Page 1/2

PRESENTATION ET CONSERVATION



Boîte de 28 comprimés pelliculés dosés à 30 mg ou à 60 mg (11 663 €TTC la boîte).



Conservez ce médicament à **température ambiante** dans son emballage d'origine.



Gardez-le hors de la portée et de la vue des enfants.

PRESCRIPTION ET DELIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier spécialiste en hépato-gastroentérologie, médecine interne ou infectiologie.**



Il est disponible dans les **pharmacies hospitalières**. Pensez à prendre votre ordonnance et votre carte Césam vitale lors de votre première venue à l'hôpital.



Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances. Pour un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien.



Ne jetez pas les boîtes entamées ni les gélules restantes dans votre poubelle. Merci de les rapporter à votre pharmacien.

Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement.

MODE D'EMPLOI



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste.

La dose habituelle est de **un comprimé à 60 mg une fois par jour avec ou sans nourriture**. Ce médicament sera toujours associé à d'autre molécule pour augmenter l'efficacité du traitement.

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.

Le comprimé doit être avalé entier. Essayez de la prendre chaque jour à la même heure.



Oubli de prise : si vous oubliez une prise de daclastavir et que vous vous en rendez compte dans les 20 heures suivant l'heure de prise habituelle, vous devez prendre la dose oubliée de daclastavir dès que possible. Vous devez ensuite prendre la dose suivante à l'heure habituelle prévue. Ne prenez pas une double dose



Le comprimé ne doit pas être croquée ni écrasée.



Il est déconseillé de prendre DAKLINZA® pendant la grossesse et l'allaitement et lors de la conception d'un enfant. Si vous êtes une femme vous devez utiliser une méthode contraceptive efficace. Elle doit être maintenue 5 semaines après l'arrêt du traitement

INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Fatigue	Il est normal d'être fatigué pendant le traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie.	Prudence en cas de conduite de véhicule. En cas de fatigue inhabituelle, informez votre médecin.
Maux de tête Vertige, migraine	Mesurez régulièrement votre tension. Faites de l'exercice, contrôlez votre poids. Limitez la consommation de sel et d'alcool.	Prévenez votre médecin dès l'apparition de ces signes. Prudence en cas de conduite de véhicules ou de machines. Un antalgique peut vous être prescrit.
Eruption cutanée Prurit Desquamation Rougeur Irritation cutanée	Utilisez un savon doux et un agent hydratant. Évitez les expositions prolongées au soleil.	En cas de symptômes persistants ou gênant, informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager
Troubles respiratoires	Une gêne respiratoire peut apparaître pendant le traitement.	Informez votre médecin.
Troubles digestifs	Buvez régulièrement de l'eau, pratiquez des exercices physiques (ex. : marche).	Buvez 2 litres d'eau par jour, privilégiez une alimentation riche en fibres : légumes verts, fruits et fruits secs. Informez votre médecin.
Nausées Vomissements	Mangez lentement et faites plusieurs petit repas léger. Évitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas	Ces symptômes s'estompent en quelques jours. S'ils persistent, informez votre médecin. Des traitements médicaux peuvent vous soulager



Si vous ressentez des effets non mentionnés, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur ou à votre généraliste.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

QUELQUES CONSEILS



N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Si vous voyagez, pensez à prendre avec vous votre ordonnance en cours et votre traitement en quantité suffisante.

En cas de décalage horaire, adaptez-vous aux horaires du pays.