

Elaboration de la fiche :



Mise à jour :



EPCLUSA®

(SOFOSBUVIR/VELPATASVIR)

400/100 MG COMPRIME

Traitement VHC

Date d'application
Juin 2017

Version en vigueur

Page 1/2

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Boîte de 28 comprimés pelliculés. Prix d'une boîte : 14364 € la boîte, soit 513 euros le comprimé.



Présentation sous forme de comprimé pelliculé, en forme de losange, inscrit « GSI » sur une face et « 7916 » sur l'autre, couleur rose pale.



Conservez ce médicament à une **température inférieure à 30°C**, dans l'emballage extérieur.

Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

PRESCRIPTION ET DELIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier spécialiste en hépato-gastroentérologie, médecine interne ou infectiologie.**



Il n'est pas disponible dans les **pharmacies de ville.**

Il est disponible uniquement dans les **pharmacies hospitalières.**



Pensez à prendre votre ordonnance et votre carte vitale lors de vos visites à l'hôpital. Pour un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien.



Ne jetez pas les boîtes entamées ni les unités de médicaments restantes dans votre poubelle. Merci de les rapporter à la pharmacie du centre hospitalier.

Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement.

MODE D'EMPLOI



La dose habituelle chez l'adulte est de **un comprimé par jour** à prendre au cours ou en dehors d'un repas.

Il est important de prendre votre comprimé toujours au même moment de la journée.

Le bon suivi du traitement est nécessaire à son efficacité.



En cas d'oubli d'une prise du traitement :

- < 18 heures : prendre dès que possible le comprimé oublié et continuer ensuite selon la posologie prescrite.

- > 18 heures : ne pas prendre le comprimé oublié. Prendre la dose suivante comme prévu.

En cas de vomissement :

- dans les 3 heures après la prise du traitement, prendre un autre comprimé.
- au-delà de 3 heures après la prise, ne pas prendre un autre comprimé.

Ne pas prendre une dose double pour compenser celle oubliée.



Les comprimés ne doivent ni être écrasés, ni coupés ou croqués.



Il n'existe pas de données sur l'utilisation d'EPCLUSA chez la femme enceinte. Il ne doit pas être utilisé chez la femme enceinte, ni pendant l'allaitement sauf avis du médecin.

Il n'est pas recommandé chez les femmes en âge de procréer sauf si des mesures contraceptives appropriées sont utilisées.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament est contre-indiqué avec les médicaments suivants :

- rifampicine, rifabutine, carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne.



Ce médicament est déconseillé avec la prise concomitante d'inhibiteurs de la pompe à proton (oméprazole, lansoprazole, pantoprazole, ésoméprazole, rabéprazole), d'oxcarbamazépine, rifapentine, et les antirétroviraux contenant de l'efavirenz.

En cas de doute, demander conseil à votre pharmacien.



Il faut éviter la prise de **millepertuis** (*hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, goutte...), et de **pamplemousse** (jus, pulpe).



Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Céphalées Migraine	A conseiller : repos fréquent, bonne hygiène de vie, exercices légers (marche). Limitez la consommation de sel et d'alcool.	En cas de douleur, la prise d'un antalgique (paracétamol) est recommandée à raison de 1g toutes les 4 à 6 heures sans dépasser 4g par jour. Prudence en cas de conduite de véhicules ou de machines.
Fatigue	Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.	Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.
Nausées et Vomissements	Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.	Ces symptômes s'estompent en quelques jours. S'ils persistent, informez votre médecin. Des traitements médicaux peuvent vous soulager.

QUELQUES CONSEILS



N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



si vous voyagez, pensez à prendre avec vous votre ordonnance en cours et votre traitement en quantité suffisante.

En cas de décalage horaire, adaptez-vous aux horaires du pays.