#### **FICHE PATIENTS**

Elaboration de la fiche :



Mise à jour :



## **HARVONI®**

# (LEDISPAVIR/SOFOSBUVIR) 90/400 MG COMPRIME

Traitement VHC

Date d'application

Juin 2017

Version en vigueur

Page 1/2

#### PRESENTATION ET CONSERVATION



Flacon de 28 comprimés en forme de losange orange. Prix d'une boite : 15 333 €, soit 547 euros le comprimé.



Conservez ce médicament à **température ambiante** dans son emballage d'origine à l'abri de l'humidité.



Gardez-le hors de la portée et de la vue des enfants.

#### PRESCRIPTION ET DELIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre médecin hospitalier spécialiste en hépatogastroentérologie, médecine interne ou infectiologie.



Il n'est pas disponible dans les pharmacies de ville.

Il est disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières.



Pensez à prendre votre ordonnance et votre carte vitale lors de vos visites à l'hôpital. Pour un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien.



Ne jetez pas les boîtes entamées ni les unités de médicaments restantes dans votre poubelle. Merci de les rapporter à votre pharmacien.

Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement.

#### MODE D'EMPLOI



La dose habituelle est de un comprimé à 90 mg/400 mg une fois par jour avec ou sans nourriture.

Il est important de prendre votre comprimé toujours au même moment de la journée. Le bon suivi du traitement est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.

En cas d'oubli d'une prise du traitement :

- < 18 heures : prendre dès que possible la dose oubliée et continuer ensuite selon la posologie prescrite.
- > 18 heures : ne pas prendre la dose oubliée, prendre la dose suivante au moment habituel.

Ne pas prendre de dose double pour compenser celle oubliée.

En cas de vomissement :

- Dans les 5 heures qui suivent la prise du médicament, prendre un autre comprimé ;
- Au-delà de 5 heures, il n'est pas nécessaire de reprendre un comprimé.



Les comprimés ne doivent ni être écrasés, ni coupés ou croqués.



Il est déconseillé de prendre HARVONI® pendant la grossesse et l'allaitement et lors de la conception d'un enfant. Si vous êtes une femme vous devez utiliser une méthode contraceptive efficace.

#### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Il faut éviter la prise du **millepertuis** (hyperium perforatum) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...), et le **pamplemousse** (jus, pulpe...).





Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Fatigue	Il est normal d'être fatigué pendant le traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie.	Prudence en cas de conduite de véhicule. En cas de fatigue inhabituelle, informez votre médecin.
Nausées et Vomissements	Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.	Ces symptômes s'estompent en quelques jours. S'ils persistent, informez votre médecin. Des traitements médicaux peuvent vous soulager.
Maux de tête	Mesurez régulièrement votre tension. Faites de l'exercice, contrôlez votre poids. Limitez la consommation de sel et d'alcool.	Prévenez votre médecin dès l'apparition de ces signes. Prudence en cas de conduite de véhicules ou de machines. Un antalgique peut vous être prescrit.
$\triangle$	Si vous ressentez des <b>effets non mentionné</b> ou à votre généraliste.	s, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

### QUELQUES CONSEILS



N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



si vous voyagez, pensez à prendre avec vous votre ordonnance en cours et votre traitement en quantité suffisante.

En cas de décalage horaire, adaptez-vous aux horaires du pays.