FICHE PATIENTS

Elaboration de la fiche :

CENTRE HOSPITALIER CENTRE BRETAGNE

PENNOSPITAL KREIZ-BREIZH

Mise à jour :

RÉSEAU Hépatite Bretagne

VIEKIRAX® EXVIERA®

(OMBITASVIR/PARITAPREVIR/RITONAVIR,DASABUVIR)
12.5 MG/75 MG/50MG, 250MG COMPRIME

Traitement VHC

Date d'application Juin 2017

Version en vigueur

PRESENTATIONS ET CONSERVATION

Deux fois deux boites de 14 comprimés sous forme de blister (avec inscription matin/soir).
Prix d'une boite :

Présentation sous forme de comprimés.

Conservez ce médicament à une **température inférieure à 30°C**, dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité.

Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

PRESCRIPTION ET DELIVRANCE

Ces médicaments sont prescrits et renouvelés par votre **médecin hospitalier spécialiste en hépato-gastroentérologie, médecine interne ou infectiologie.**

Ils ne sont pas disponibles dans les **pharmacies de ville.**
Ils sontdisponible uniquement dans les **pharmacies hospitalières.**

Pensez à prendre votre ordonnance et votre carte vitale lors de vos visites à l'hôpital. Pour un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien habituel.

Ne jetez pas les boîtes entamées ni les unités de médicaments restantes dans votre poubelle. Merci de les rapporter à la pharmacie du centre hospitalier.
Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement.

MODE D'EMPLOI

La dose habituelle chez l'adulte est de **<u>3 comprimés le matin et 1 comprimé le soir</u> à prendre au cours d'un repas.**
Il est important de prendre votre comprimé toujours au même moment de la journée.
<u>Le bon suivi du traitement</u> est nécessaire à son efficacité.

En cas d'oubli d'une prise du Viekirax :

- **< 12 heures : prendre dès que possible la dose oubliée** et continuer ensuite selon la posologie prescrite.
- **> 12 heures, ne pas prendre** la dose oubliée, prendre la dose suivante au moment habituel.

En cas d'oubli d'une prise de l'Exviera

- **< 6 heures : prendre dès que possible la dose oubliée** et continuer ensuite selon la posologie prescrite.
- **> 6 heures, ne pas prendre** la dose oubliée, prendre la dose suivante au moment habituel.

En cas de vomissement :

- **dans les 3 heures** qui suivent la prise du médicament, prendre un autre comprimé
- au-delà de 3 heures, il n'est pas nécessaire d'en reprendre un autre.

Ne pas prendre une dose double pour compenser celle oubliée.

MODE D'EMPLOI	
	Les comprimés ne doivent ni être écrasés, ni coupés ou croqués.
	Il est déconseillé de prendre ce traitement pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous êtes une femme, vous devez utiliser une méthode contraceptive efficace.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES	
	Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. **Précisez à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.**
	En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.
	Il faut éviter la prise de **millepertuis** (*hyperium perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, goutte…), et de **pamplemousse** (jus, pulpe).

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Prurit		Si les symptômes deviennent gênants, consulter votre médecin. Un traitement par antihistaminiques par voie orale ou par topique pourront vous êtes proposés.
Fatigue	Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.	Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.
Nausées	Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.	Ces symptômes s'estompent en quelques jours. S'ils persistent, informez votre médecin. Des traitements médicaux peuvent vous soulager.

QUELQUES CONSEILS	
	N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.
	Ce médicament contient du lactose .
	si vous voyagez, pensez à prendre avec vous votre ordonnance en cours et votre traitement en quantité suffisante. ***En cas de décalage horaire, adaptez-vous aux horaires du pays.***