FICHE PATIENTS		
Elaboration de la fiche : Centre Hospitalier Centre Bretagne Mise à jour : Réseau Hépatite Bretagne	**ZEPATIER®** **(ELBASVIR/GRAZOPREVIR)** **50 MG/100 MG COMPRIME**	Traitement VHC Date d'application Juin 2017 Version en vigueur Page 1/2

PRESENTATIONS ET CONSERVATION

Boîte de 28 comprimés, sous plaquette thermoformée (avec inscription des jours de la semaine sur les blisters). Prix d'une boite : 9 577 euros HT, soit 342 euros le comprimé.

Présentation sous forme de comprimés.

Conservez ce médicament à une **température inférieure à 30°C,** dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité.

Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

PRESCRIPTION ET DELIVRANCE

Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier spécialiste en hépato-gastroentérologie, médecine interne ou infectiologie.**

Il n'est pas disponible dans les **pharmacies de ville.**
Il est disponible uniquement dans les **pharmacies hospitalières.**

Pensez à prendre votre ordonnance et votre carte vitale lors de vos visites à l'hôpital. Pour un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien habituel.

Ne jetez pas les boîtes entamées ni les unités de médicaments restantes dans votre poubelle. Merci de les rapporter à la pharmacie du centre hospitalier.
Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement.

MODE D'EMPLOI

La dose habituelle chez l'adulte est de **<u>un comprimé par jour</u> à prendre au cours ou en dehors d'un repas.**
Il est important de prendre votre comprimé toujours au même moment de la journée.
<u>Le bon suivi du traitement</u> est nécessaire à son efficacité.

En cas d'oubli d'une prise du traitement

- **< 16 heures** : **prendre dès que possible la dose oubliée** et continuer ensuite selon la posologie prescrite.
- **> 16 heures, ne pas prendre** la dose oubliée, prendre la dose suivante au moment habituel.

En cas de vomissement :

- **dans les 4 heures** qui suivent la prise du médicament, prendre un autre comprimé
- au-delà de 4 heures, il n'est pas nécessaire d'en reprendre un autre.

Ne pas prendre une dose double pour compenser celle oubliée.

Les comprimés ne doivent ni être écrasés, ni coupés ou croqués.

Il est déconseillé de prendre ZEPATIER® pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous êtes une femme, vous devez utiliser une méthode contraceptive efficace.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES	
	Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. **Précisez à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.** En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.
	Il faut éviter la prise de **millepertuis** (*hyperium perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, goutte…), et de **pamplemousse** (jus, pulpe).

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Diminution de l'appétit	Boire entre les repas. Eviter les aliments frits, gras ou épicés. Manger lentement. Faire plusieurs petits repas légers.	Si les symptômes deviennent gênants, consulter votre médecin.
Insomnie, anxiété, asthénie, fatigue, irritabilité, dépression	Veillez à avoir une bonne hygiène de vie. Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.	En soirée : privilégier les moments calmes pour faciliter l'endormissement (lecture par exemple), éviter les écrans qui peuvent stimuler l'attention, prendre le repas du soir à distance du coucher. Eviter le café, thé soda en fin de journée, privilégier des tisanes. La pratique d'une activité sportive pendant la journée (marche par exemple) peut limiter l'anxiété et faciliter l'endormissement. Si les symptômes deviennent gênants, consulter votre médecin.
Céphalées	A conseiller : repos fréquent, bonne hygiène de vie, exercices légers (marche).	En cas de douleur, la prise d'un antalgique (paracétamol) est recommandée à raison de 1 g toutes les 4 à 6 heures sans dépasser 4 g par jour. Si les symptômes deviennent gênants, consulter votre médecin.
Etourdissements	Eviter de se lever brutalement afin de réduire le risque d'hypotension orthostatique.	Si les symptômes deviennent gênants, consulter votre médecin.
Prurit		Si les symptômes deviennent gênants, consulter votre médecin. Un traitement par antihistaminiques par voie orale ou par topique pourront vous êtes proposés.
Alopécie (perte de cheveux)	Si les symptômes deviennent gênants, consulter votre médecin.	
Arthralgie, myalgie	A conseiller : Boisson régulière. A éviter : gestes répétitifs et les efforts physiques importants.	Traitement symptomatique par paracétamol 1 g toutes les 4 à 6 heures sans dépasser 4 g par jour. Si les symptômes deviennent gênants, consulter votre médecin.
Sécheresse buccale	Veillez à avoir une bonne hydratation.	Si les symptômes deviennent gênants, consulter votre médecin.

QUELQUES CONSEILS	
	N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.
	Ce médicament contient du lactose et du sodium.
	si vous voyagez, pensez à prendre avec vous votre ordonnance en cours et votre traitement en quantité suffisante. ***En cas de décalage horaire, adaptez-vous aux horaires du pays.***