

HYDREA® hydroxycarbamide

PRESCRIPTION ET DELIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier ou de ville**.
Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.



Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances.
Pour un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien.




Votre pharmacien peut vous conseiller pour la prise de votre ou vos traitement(s).



Ne jetez pas les boîtes entamées ni les médicaments restants dans votre poubelle.
Merci de les rapporter à votre pharmacien.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Boîte de 20 gélules roses et vertes dosées à 500 mg (4,79 € TTC).



Conservez ce médicament à une **température inférieure à 25°C**.
Gardez-le hors de la portée et de la vue des enfants.

MODE D'EMPLOI

La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. **Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.**



Les gélules d'hydroxycarbamide (HYDREA®) sont à avaler entières sans être mâchées **avec un grand verre d'eau**, en dehors ou au cours des repas, en 1 prise par jour.



Si vous n'arrivez pas à avaler les gélules, vous pouvez disperser leur contenu dans un verre d'eau, remuer avec une cuillère puis boire sans attendre. Votre pharmacien ou médecin peut vous aider.



Pendant le traitement, il est important de boire davantage pour maintenir le bon fonctionnement du rein (si possible 1,5 litre par jour), notamment des boissons riches en bicarbonates (de type Vichy Saint Yorre).

INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.



N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre. En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires	Limitez, si possible, les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin.
Diarrhée	Si c'est un effet qui arrive souvent : évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. Surveillance des sels minéraux par analyse.	Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, bouillons, boissons gazeuses, thé ou tisanes autorisés en prenant garde au risque d'interaction). Privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 diarrhées par jour).

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Nausées et vomissements	Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de 2 vomissements par jour).
Stérilité masculine	Votre médecin peut vous proposer une congélation de sperme avant le début du traitement.	Ce problème concerne les hommes, le traitement peut entraîner une baisse de fertilité, réversible à l'arrêt du traitement.
Saignements inhabituels	En cas de saignements buccaux, préférez une brosse à dents souple. L'utilisation des thermomètres rectaux est à éviter. Certains médicaments sont déconseillés (aspirine, ibuprofène...).	Prévenez votre médecin. En cas de saignement de nez, penchez la tête en avant en exerçant une légère pression sur vos narines.
Maux de tête, confusions, vertiges, malaise		Prévenez votre médecin dès l'apparition de ces signes. Prudence en cas de conduite de véhicules ou de machines.
Inflammation de la bouche	Evitez les aliments acides, épicés et irritants. Utilisez une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool.	En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contactez votre médecin.
Eruption cutanée	Préférez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions prolongées au soleil, utilisez une protection solaire écran total.	En cas de symptômes persistants ou gênants, prévenez le médecin. Des traitements médicaux peuvent vous soulager.
D'autres effets secondaires tels une perte de cheveux, des douleurs articulaires, une modification du bilan hépatique, urinaire, ou autre peuvent survenir.		
⚠ Si vous ressentez des effets non mentionnés , parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien.		

QUELQUES CONSEILS

Contactez rapidement le médecin en cas de :



- signes infectieux (fièvre, toux, frissons ...).
- apparition de selles noires, de saignements de nez et crachats comportant du sang.
- forte douleur, notamment au niveau des articulations, qui augmente avec le temps.
- difficultés à respirer ou toux anormale.



N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.

Si vous avez oublié de prendre vos gélules d'hydroxycarbamide (HYDREA®), ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle. Merci de le noter dans votre carnet de suivi.



En cas de vomissements, ne prenez pas de dose supplémentaire et ne doublez pas la prise suivante.



Evitez l'exposition prolongée au soleil et protégez-vous si vous devez le faire (crème solaire indice 50 +, vêtements longs).



Ne prenez pas hydroxycarbamide (HYDREA®) pendant la grossesse et l'allaitement. Vous devez utiliser une méthode contraceptive efficace.

REMARQUES :