

# ANANDRON® nilutamide

## PRESCRIPTION ET DELIVRANCE

Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier ou de ville**.



Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.



Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances. Pour un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien.



**Ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants dans votre poubelle.** Merci de les rapporter à votre pharmacien.

**Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement**, veuillez lui rapporter vos boîtes et comprimés non utilisés lors du renouvellement suivant.

## PRESENTATIONS ET CONSERVATION

Deux présentations sont disponibles, sous forme de plaquettes thermoformées :



Boite de 90 comprimés à **50 mg** : ronds, blancs, biconvexes, portant la marque « 168 » au-dessus du « **A** » sur une face et le logo de Roussel sur l'autre (111,66 € HT).



Boite de 30 Comprimés à **150 mg** : ronds, blancs, biconvexes, portant la marque « 168 » au-dessus du « **D** » sur une face et le logo de Roussel sur l'autre (104,04 € HT).



Conservez ce médicament à une **température inférieure à 25°C**, à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.

**Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.**

## MODE D'EMPLOI

La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. Le schéma habituel est :

-Dose de départ : 300 mg/j durant 4 semaines.

-Dose d'entretien : 150 mg/jour.

**Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.**



Les comprimés d'ANANDRON® sont à avaler avec un **grand verre d'eau en une ou plusieurs prises par jour au cours ou en dehors des repas. Essayez de les prendre chaque jour à la même heure.**



En cas de nutrition par sonde ou pour les patients ayant des difficultés à avaler, les comprimés d'ANANDRON® **peuvent être broyés.**

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.



**N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.**

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Troubles visuels	Portez des verres teintés	La prudence s'impose pour les utilisateurs de machine et en cas de conduite de véhicule Evitez de conduire la nuit.
Nausées et vomissements	Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).
Bouffées de chaleur Transpiration	Evitez les facteurs déclenchant comme l'alcool, la caféine, le tabac, les aliments chauds et épicés le stress et la chaleur.	Buvez beaucoup d'eau fraîche. Restez au frais. Portez des vêtements légers.
Difficulté à respirer, toux	Limitez si possible les contacts avec des personnes ayant une infection contagieuse	Contactez le médecin si ces signes surviennent.
Troubles hépatiques	Evitez les aliments frits, gras, trop sucrés et l'alcool.	Faites régulièrement vos analyses biologiques pour contrôler votre fonction hépatique.

Une impuissance, une baisse de la libido, un gonflement et des douleurs au niveau de la poitrine, une hypersudation et une perte des cheveux peuvent survenir pendant le traitement, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin.



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien.

### QUELQUES CONSEILS



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- Difficultés à respirer, toux anormale ou douleurs thoraciques.
- Signes faisant suspecter une atteinte hépatique : douleur abdominale, jaunissement de la peau, urines foncées ou démangeaisons.



Evitez de boire de l'alcool pendant le traitement (malaise avec rougeur brusque du visage).



**N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.**



**Si vous avez oublié de prendre vos comprimés d'ANANDRON<sup>®</sup>**, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante, sans la doubler, sera prise à l'heure normale. Merci de le noter dans votre carnet de suivi.



Il est conseillé d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle.



Ce médicament contient du lactose. En cas d'intolérance (ballonnements, douleurs ou crampes abdominales, diarrhée ou constipation, troubles de la concentration), contactez votre médecin.

REMARQUES :