

# SPRYCEL® dasatinib

## PRESCRIPTION ET DELIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier spécialiste en cancérologie, en hématologie ou en oncologie médicale** (ANSM site le 10 04 2015)  
Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.



Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances. Pour un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien.



**Ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants dans votre poubelle.** Merci de les rapporter à votre pharmacien.

**Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement,** veuillez lui rapporter vos boîtes et comprimés non utilisés lors du renouvellement suivant.

## PRESENTATIONS ET CONSERVATION

Comprimé pelliculé blanc à blanc cassé de cinq dosages différents sous plaquette thermoformée:



Boîte de 60 comprimés dosés à **20 mg** (1814,40 € HT).



Boîte de 60 comprimés dosés à **50 mg** (3627,90 € HT).



Boîte de 60 comprimés dosés à **70 mg** (3627,90 € HT).



Boîte de 30 comprimés dosés à **100 mg** (3627,90 € HT).



Boîte de 30 comprimés dosés à **140 mg** (3927,90 € HT).



Conservez ce médicament à une **température inférieure à 25°C**, à l'abri de la lumière et de l'humidité.  
**Gardez-le hors de la portée et de la vue des enfants.**

## MODE D'EMPLOI

La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. L'administration se fait habituellement en **une prise par jour**.

**Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.**



Les comprimés de SPRYCEL® sont à avaler **entiers avec un grand verre d'eau** de préférence le soir et plutôt en fin de repas. Essayez de respecter chaque jour la même heure de prise.



Les comprimés ne doivent être ni écrasés, ni coupés ou croqués.



Le **pamplemousse** (jus, pulpe) est à éviter pendant votre traitement par SPRYCEL®.

## INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...)



**N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.**

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.



Évitez les médicaments utilisés pour traiter les brûlures d'estomac. En cas de besoin, ces médicaments doivent être pris à distance du SPRYCEL®. Demandez conseil à votre pharmacien.

**Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.**

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
<b>Diarrhée</b>	Si c'est un effet qui arrive souvent : évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. Surveillance des sels minéraux par analyse..	Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 diarrhées par jour).

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
<b>Œdème</b>	Surveillez régulièrement votre poids.	En cas de prise de poids rapide et inattendue, avertissez votre médecin.
<b>Nausées et vomissements</b>	Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).
<b>Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires</b>	Limitez, si possible, les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin.
<b>Saignements inhabituels</b>	En cas de saignements buccaux, préférez une brosse à dents souple. L'utilisation des thermomètres rectaux est à éviter. Certains médicaments sont déconseillés (aspirine, ibuprofène...).	Prévenez votre médecin. En cas de saignement de nez, penchez la tête en avant en exerçant une légère pression sur vos narines.
<b>Difficulté à respirer, toux</b>	Limitez, si possible, les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse.	Contactez le médecin si ces signes surviennent.
<b>Eruption cutanée</b>	Préférez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions prolongées au soleil. Ecran total.	Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.
<b>Arthralgies-myalgies</b>	Limitez si possible les gestes répétitifs.	Vous pouvez prendre un calmant de la douleur conseillé par votre médecin. Prévenez votre médecin si persistance.
<b>Douleurs extrémités Symptômes cardiaques</b>	Surveillance régulière de votre cœur (électrocardiogramme, analyses pour sels minéraux : potassium, calcium, magnésium,...) et de votre tension	Prévenez votre médecin dès l'apparition de ces signes.

Une **perte de cheveux** peut survenir pendant le traitement, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin.



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien.

## QUELQUES CONSEILS



**Contactez rapidement le médecin** en cas de :

- signes infectieux (fièvre, toux, frissons ...).
- apparition de selles noires, de saignements de nez et crachats comportant du sang.
- difficultés à respirer ou toux anormale.
- essoufflement, œdème des membres ou douleurs thoraciques



**N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.**



**Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de SPRYCEL<sup>®</sup>, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle. Merci de le noter dans votre carnet de suivi.**



Ce médicament contient du lactose. En cas d'intolérance (ballonnements, douleurs ou crampes abdominales, diarrhée ou constipation, troubles de la concentration), contactez votre médecin.



Evitez l'**exposition prolongée au soleil** et **protégez-vous** si vous devez le faire.

**REMARQUES :**

Remerciements : - au Groupe VOCC B PL : Observatoire dédié au cancer BPL, réseaux OncoBretagne et ONCO Pays de la Loire, cliniciens, pharmaciens et infirmières d'établissements volontaires B PL, Conseils de l'Ordre B PL, Directions Régionales du Service Médical B PL, OMEDIT B PL, Cancéropôle Grand Ouest, Comité de patients et URPS B PL

- au CHU Hôtel Dieu Nantes, au Comité des patients du CHRU de Brest et à l'ICO René Gauducheau

- à l'OMÉDIT de Haute-Normandie et au Réseau Onco-Normand