



## QU'EST-CE QUE ALUNBRIG® BRIGATINIB ?

- Anticancéreux utilisé dans le traitement de certains types de cancer du poumon (avancés).
- Prescrit et renouvelé par votre médecin hospitalier spécialiste en oncologie.
- Disponible en pharmacies de ville sur présentation de votre ordonnance.

Boîtes de 28 comprimés de couleur blanc à blanc-cassé, 3 dosages différents :

- 30 mg : comprimés ronds, environ 7 mm de diamètre, inscription « U3 » sur une face
- 90 mg : comprimés ovales, environ 15 mm de long, inscription « U7 » sur une face
- 180 mg : comprimés ovales, environ 19 mm de long, inscription « U13 » sur une face

Ce médicament contient du lactose. En cas d'intolérance, contactez votre médecin.



• A conserver à température ne dépassant pas 30°C, hors de la vue et de la portée des enfants.



• Ne sortez pas les comprimés de la plaquette pour les mettre dans un pilulier.



• Lavez-vous soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.

• Ne jetez pas les plaquettes entamées, merci de les rapporter à votre pharmacien.

## COMMENT PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

  
A remplir avec l'aide d'un  
professionnel de santé\*\*

Renseigné avec

.....  
Selon l'ordonnance du  
...../...../.....

Dose par jour	..... mg	=	..... comprimé(s)
Quand ?	.....h.....	<b>1 prise par jour à heure fixe pendant ou en dehors des repas</b>	
Comment ?		Avez le ou les comprimés entiers, avec de l'eau, l'un à la suite de l'autre, chaque jour au même moment de la journée. Ne pas mâcher, ni couper, ni écraser, ni dissoudre.	

Vous pouvez vous aider du **carnet de suivi\*** et d'un **calendrier** pour repérer les prises :

N'arrêtez jamais ou ne modifiez jamais le rythme de prise de votre traitement sans l'avis de votre médecin

\*\* Cette fiche n'est pas une ordonnance, référez vous à votre ordonnance la plus récente.

## QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI OU DE VOMISSEMENT ?



En cas d'oubli, ne prenez pas la dose manquée, ni de dose double. En cas de vomissement, ne prenez pas de nouvelle dose. Prenez simplement la dose suivante comme prévu le lendemain  
Pensez à le noter dans votre carnet de suivi\*

## INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS ET/OU VOTRE ALIMENTATION

Vérifiez avec  **votre médecin et votre pharmacien**  que les médicaments (prescrits ou non) et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires...) que vous consommez sont compatibles avec votre traitement. Des interactions peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables.

Ne prenez pas de **millepertuis**, évitez la prise de **pamplemousse (jus, pulpe)** et de **certaines substances pouvant favoriser une hypertension ou une hyperglycémie** sans avis médical.



ALUNBRIG® déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement



Utilisez une méthode efficace non hormonale de contraception pendant votre traitement et jusqu'à 4 mois après la dernière dose



# QUELS EFFETS INDÉSIRABLES PEUVENT SURVENIR AVEC ALUNBRIG® BRIGATINIB ?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables	Prévention
Pression artérielle élevée	Mesurez régulièrement votre tension (auto-mesure à domicile, vous pouvez également demander de l'aide à votre pharmacien). Faites de l'exercice, contrôlez votre poids. Limitez votre consommation de sel et d'alcool.
Nausées vomissements perte d'appétit	Mangez lentement et fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.
Diarrhées	Pensez à bien vous hydrater : au moins 2 litres d'eau par jour ; Privilégiez une alimentation pauvre en fibres (féculents, carotte, banane...) ; Evitez certains aliments (café, boissons glacées, laitages, alcool, fruits-légumes crus, céréales, gras, épices...).
Constipation	Pensez à bien vous hydrater : au moins 2 litres d'eau par jour ; Privilégiez une alimentation riche en fibre (légumes verts, fruits, fruits secs...)
Inflammation de la bouche	Respectez une hygiène bucco-dentaire stricte : brosse à dents souple, dentifrice non mentholé non abrasif, hydratation des lèvres (lubrifiant gras), stimulation salivaire (glaçons, chewing-gums...), bains de bouche 4 à 6 fois/jour au bicarbonate de sodium. Privilégiez une alimentation fractionnée, liquide à la paille ou mixée légèrement chaude ou ambiante voire froide ou glacée. Evitez la consommation d'alcool, de café, de tabac et de certains aliments (acides, épicés, irritants, frits et/ou salés, durs/croquants, chauds...).
Eruption cutanée sècheresse photosensibilité	Utilisez un nettoyant doux sans savon et un agent hydratant. Evitez l'eau chaude.  Evitez les expositions au soleil, protégez-vous si vous devez le faire (vêtements, protection solaire écran total...).
Fatigue	Privilégiez une alimentation saine et hydratation suffisante. Respectez des temps de repos dans la journée mais essayez de conserver une activité même modérée. Soyez prudent pour la conduite automobile.

 Seuls certains effets indésirables des plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

## QUE FAIRE EN CAS DE SURVENUE D'EFFET(S) INDÉSIRABLE(S) ?

- Prenez les médicaments prescrits contre les effets indésirables en respectant les doses
- Informez votre médecin dès les premiers signes persistants
- Respectez les mesures de prévention

**Contactez rapidement votre médecin**, en cas de :

- difficultés à respirer, toux, essoufflement
- rythme cardiaque lent ou irrégulier, palpitations, maux de tête, sensations vertigineuses, vision trouble, douleurs dans la poitrine ou essoufflement
- vision floue ou trouble, sensibilité à la lumière
- douleurs, sensibilité ou faiblesse musculaire inexplicée
- douleurs abdominales
- sensation de soif ou faim inhabituelle, un besoin plus fréquent d'uriner, mal de ventre, fatigue ou confusion
- perturbation de votre bilan sanguin
- tout effet indésirable persistant ou s'aggravant



**Contacts utiles :**

---

---

---

**Remarques :**

---

---

---

\*Carnet de suivi disponible sur les sites [www.omeditbretagne.fr](http://www.omeditbretagne.fr) ou [www.omedit-paysdelaloire.fr](http://www.omedit-paysdelaloire.fr)

Pour en savoir plus, reportez vous à la notice de votre médicament.

Vous avez la possibilité de déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement.sante.gouv.fr](http://signalement.sante.gouv.fr)