

## Comparaison vaccin Covid-19 Comirnaty® (Pfizer/BioNTech) et vaccin Moderna®



		Vaccin Comirnaty®(Pfizer/BioNTech)	Vaccin Covid-19 Moderna®
Plateforme/ Composition		ARN messager codant pour la protéine S encapsulé dans des nanoparticules lipidiques	
Âge		16 ans et plus	18 ans et plus
Présentation		Flacon multidoses (6 doses) Dispersion <b>à diluer</b>	Flacon multidoses (10 doses) Dispersion <b>prête à l'emploi</b>
Conservation	Avant décongélation	Jusqu'à date de péremption entre -60°C et -90°C	Jusqu'à date de péremption entre -15°C et -25°C
	Après décongélation	<b>5 j</b> entre +2°C et +8°C à l'abri de la lumière <b>2 h</b> $\leq$ +25°C/+30°C	<b>30 j</b> entre +2°C et +8°C à l'abri de la lumière <b>12 h</b> entre +8°C et +25°C
	Avant administration	<b>Après dilution :</b> 6 h entre +2°C et ≤ +25°C/+30°C	<b>Après percution flacon</b> : 6 h entre +2°C et +25°C
Préparation	Dilution	1,8 mL NaCl 0,9% avec seringue 2 mL et aiguille hypodermique diamètre 8/10mm	Non concerné (Suspension prête à l'emploi)
	Nombre doses unitaires à prélever/flacon	<b>5 à 6</b> doses unitaires de 0,3ml	<b>10</b> doses unitaires de 0,5ml
Administration	Dispositifs médicaux	Seringue 1 mL- Aiguille IM à adapter en fonction de la corpulence du patient	
	Site injection	IM dans le muscle deltoïde de la partie supérieure du bras	
Schéma vaccinal		<b>2 doses</b> espacées de <b>21 jours</b> (personnes âgées en EHPAD/USLD) à <b>28 jours</b> (autres personnes éligibles la vaccination)	<b>2 doses</b> espacées de <b>28 jours</b>

Document réalisé à partir de: Guide de la vaccination contre la Covid-19 en EHPAD et USLD (Ministère des Solidarités et de la Santé), Portfolio « vaccination anti-COVID » à destination des professionnels de santé (Ministère des Solidarités et de la Santé),