## VACCINATION ANTI-COVID ET CANCER:

Recommandations vaccinales des patients atteints de cancer à destination des professionnels de santé

## **❖ IMPORTANCE DE LA VACCINATION ANTI-COVID:**

Les patients atteints d'un cancer font partie des groupes à risque de développer des complications sévères liées à la COVID-19, notamment en cas de tumeurs malignes bronchiques, métastatiques ou hématologiques, ainsi qu'en cas de traitement systémique. Une infection à la COVID-19 peut retarder la prise en charge médicamenteuse et induire une perte de chance sur l'efficacité attendue.

## **❖ POINTS DE VIGILANCE AMENANT À ÉVITER LA VACCINATION DANS L'ÉTAT**ACTUEL DES CONNAISSANCES :

- Allergie connue sévère (cf. résumé des recommandations françaises (SFA/FFAL/CNP allergologie 12 janvier 2021 https://sfa.lesallergies.fr/vaccination-contre-la-covid-19-et-antecedents-allergiques)
- ➤ Infection à la COVID-19 dans les 3 derniers mois
- Autre vaccination dans les 14 derniers jours
- Infection en cours ou fièvre (>38°C dans les 48 dernières heures)

Les recommandations sur la vaccination ne se substituent pas à la connaissance particulière de l'état des patients atteints d'un cancer par les équipes médicales qui les suivent. La relation médecin/patient, dans le processus de décision partagée conduisant à la vaccination, reste essentielle\*.

Vous avez la possibilité de consulter les recommandations de l'INCa sur la vaccination COVID des patients atteints de cancer du 1<sup>er</sup> février 2021 en tenant compte de l'évolution du calendrier vaccinal.

## Dans le cadre de la traçabilité de la vaccination, il est important de noter :

- la date de la vaccination
- le numéro de lot
- Le nom de spécialité du vaccin
- ⇒ Si vous constatez des effets secondaires, prenez contact auprès de votre Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV).

\*Afin de vous aider dans la prise de décision, différentes recommandations ont été rédigées à ce jour (European Society for Medical Oncology, Institut Gustave Roussy, INCa...). Au vu du contexte sanitaire, ces recommandations peuvent évoluer.

En cas de complication infectieuse, d'état général altéré ou d'hospitalisation dans un contexte aigu :

Report de la vaccination jusqu'à résolution des complications

<u>RAPPEL</u>: LA VACCINATION DE L'ENTOURAGE DU PATIENT ET DES PROFESSIONNELS DE SANTE EST CONSEILLEE.











