



1. Entretien initial

En amont de l'entretien initial, le pharmacien procède à l'**analyse des interactions** entre la thérapie anticancéreuse du patient et l'ensemble de ses traitements. Il prépare un **plan de prise personnalisé**. Il lui appartient également de s'approprier les questions des grilles d'entretien présentes dans les fiches de suivi.

Lors de l'entretien initial, le pharmacien adopte une posture d'écoute et d'accompagnement pertinente, adaptée aux besoins du patient ; il utilise un langage adéquat.

Il recueille les informations générales relatives au patient et évalue ses connaissances vis-à-vis du traitement, notamment au regard des informations qu'il a reçues du médecin. Il renouvelle son analyse en tenant compte du régime alimentaire du patient, de son recours à l'automédication, à l'homéopathie, aux compléments alimentaires, aux huiles essentielles, à l'aromathérapie, etc... Il l'informe des modalités de prise de son traitement.

- Le pharmacien évalue la compréhension des informations qu'il délivre à son patient lors des entretiens. Ainsi, le pharmacien considère qu'une notion est :
 - **acquise** dès lors qu'elle est parfaitement intégrée par le patient et que ce dernier est capable de la restituer avec ses propres termes et de la mettre en pratique,
 - **partiellement acquise** dès lors que le patient a des connaissances incomplètes ou imprécises,
 - **non acquise** dès lors que le patient n'a aucune connaissance sur le sujet.
- Le pharmacien propose d'ouvrir au patient, le cas échéant, son dossier pharmaceutique (DP) selon les dispositions réglementaires en vigueur, dans le respect du libre choix du patient d'accepter ou non l'ouverture. **Il rappelle l'utilité du DP et du dossier médical partagé (DMP)** pour détecter d'éventuelles interactions médicamenteuses, optimiser l'analyse des interactions médicamenteuses possibles, coordonner le suivi du patient avec ses prescripteurs, et permettre aux professionnels participant à la prise en soins d'y inscrire les nouvelles prescriptions (DP, DMP) et suivis biologiques (DMP), ce qui favorisera la **transmission** et la **traçabilité des données entre la ville et l'hôpital**. Il est aussi important pour le pharmacien de consulter, lorsqu'ils en ont la possibilité, les documents du parcours de soins du patient contenus dans le dossier communiquant de cancérologie (DCC) : réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) et programme personnalisé de soins (PPS).

BOÎTE À OUTILS



L'Assurance
Maladie

[Bulletin d'adhésion et de désignation
du pharmacien](#)



[Fiche médicament VOC
Professionnels de santé](#)



[Fiche médicament VOC
Patient](#)



1. Entretien initial

Date de l'entretien initial

Nom du pharmacien

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE PATIENT

Nom, Prénom :

Age :

N° Sécurité Sociale :

Régime d'affiliation :

Adresse :

Poids : Taille : Indice de masse corporelle $IMC = \frac{\text{Poids (kg)}}{\text{Taille}^2 \text{ (m)}} :$

Nom du ou des traitements anticancéreux oraux prescrits :

Cobimétinib COTELLIC® en association au vémurafénib ZELBORAF®

Autres traitements médicamenteux au long cours :

Autres médicaments / produits consommés par le patient :

Médecines complémentaires (homéopathie, compléments alimentaires, huiles essentielles ; achats par internet) :

Autres :



1. Entretien initial

Habitudes de vie :

(alimentation, alcool, tabac, activité physique, sport de contact, activité manuelle, déplacement, voyage...)

Allergies et intolérances :

Cobimétinib COTELLIC® contient du lactose. Les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit total en lactase ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ne doivent pas prendre ce médicament.

Identification des situations nécessitant assistance (difficultés motrices, sensorielles, cognitives) :

Coordonnées du médecin traitant, de l'oncologue et du service d'oncologie :

Informations reçues concernant l'offre de soins (supports éventuels, dispositif d'annonce de la maladie, échanges avec un professionnel de santé, réseau régional ou territorial de cancérologie, établissement réalisant les soins) :

- Le pharmacien doit rappeler au patient que l'automédication n'est pas recommandée** du fait des interactions médicamenteuses potentielles, et que l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien est nécessaire avant tout nouveau traitement, qu'il soit soumis à prescription ou non.
- Le pharmacien informe également le patient sur les contre-indications** (médicamenteuses, vaccinales, alimentaires). La connaissance des habitudes alimentaires du patient et des comportements de santé (caractéristiques de son régime alimentaire, utilisation de compléments alimentaires, aromathérapie, prise de médicaments dispensés sans ordonnance, etc...) aidera également le pharmacien à prodiguer un conseil adapté.



1. Entretien initial

ÉVALUATION DE L'APPROPRIATION DU TRAITEMENT ET OBSERVANCE

À quoi sert votre traitement ?

Traitement du mélanome non résecable ou métastatique

- A (acquis)
 PA (partiellement acquis)
 NA (non acquis)

À quelle dose vous a-t-il été prescrit ?

- A PA NA

Quels sont les médicaments à ne pas associer à votre traitement ?

- Contre-indication aux vaccins vivants atténués (dengue, fièvre jaune, rougeole, oreillons, rubéole, rotavirus, tuberculose, vaccin oral contre la poliomyélite, varicelle, zona)
- Lansoprazole (inhibiteur puissant de la P-gp) : éviter la prise (risque d'augmentation des concentrations plasmatiques du cobimétinib et du vémurafénib).
- Topiques gastro-intestinaux : respecter un intervalle minimum de 2h.
- Éviter les médicaments pouvant favoriser les saignements (ex : ibuprofène, aspirine).
- Millepertuis : éviter la prise (risque de diminution de l'efficacité du cobimétinib et du vémurafénib).

- A PA NA

Quels sont les aliments à ne pas associer à votre traitement ?

- Millepertuis : éviter la prise (risque de diminution de l'efficacité du cobimétinib et du vémurafénib).
- Ne pas consommer de pamplemousse, pomelo, orange de Séville, carambole, réglisse, Chardon-Marie, curcuma.
- Éviter les produits de phytothérapie pouvant favoriser les saignements.
- D'autres substances présentes dans les plantes, tisanes, huiles essentielles, probiotiques ou compléments alimentaires peuvent interférer avec cobimétinib et vémurafénib : vérifier systématiquement leur compatibilité auprès de votre pharmacien.

- A PA NA

Connaissez-vous la conduite à tenir vis-à-vis de l'emballage vide de votre traitement, voire des éventuels comprimés qu'il vous resterait ?

À rapporter en pharmacie dans un sachet pour destruction conformément à la procédure en vigueur ; ne pas jeter au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères.

- A PA NA

Comment percevez-vous votre pathologie et le traitement que l'on vous a prescrit ?



1. Entretien initial

Quel est votre ressenti par rapport à sa voie d'administration ? Perception possible d'un sentiment d'isolement voire d'abandon du fait d'un encadrement différent de celui d'une chimiothérapie par voie injectable, impression d'efficacité moindre de la forme orale par rapport à une forme injectable.

Votre médecin traitant est-il informé que vous êtes sous anticancéreux oraux ?

OUI NON

Connaissez-vous l'importance de respecter les prescriptions et recommandations de votre médecin (observance) ?

A PA NA

L'efficacité optimale du traitement dépend en grande partie de la capacité du patient à bien le suivre. Oublis, décalages du traitement, augmentation ou baisse de la posologie sans avis médical peuvent diminuer l'efficacité du traitement ou majorer les effets indésirables.

Connaissez-vous l'importance de la surveillance de votre traitement ?

A PA NA

Elle permet de s'assurer de l'efficacité thérapeutique du traitement et de détecter d'éventuels effets secondaires, parfois source d'ajustement/modification du traitement.

MODALITÉS D'ADMINISTRATION

Connaissez-vous le schéma de prise de votre traitement ?

A PA NA

- COTELLIC® cobimétinib : traitement en 1 prise par jour, pendant 21 jours consécutifs (J1 à J21 inclus), suivis d'une période sans traitement de 7 jours (1 cycle = 28 jours)
- ZELBORAF® vémurafénib : traitement en continu en 2 prises par jour, idéalement à 12h d'intervalle

Connaissez-vous les règles de prise de vos médicaments ?

A PA NA

- Prise à heure fixe, avec ou sans nourriture, avec un grand verre d'eau
 - ZELBORAF® vémurafénib : il est recommandé d'éviter les prises à jeun, c'est-à-dire que les prises doivent avoir lieu moins de 30 min avant un repas ou moins d'1h30 après un repas.
- Ne pas écraser, mâcher, sucer ou couper les comprimés.
- Toujours se laver les mains à l'eau savonneuse avant et après manipulation de ces médicaments et après être allé aux toilettes.

Connaissez-vous les règles de conservation de vos médicaments ?

A PA NA

- Stocker hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux domestiques, à l'écart des autres médicaments du foyer et de toute nourriture.
- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité, à température ambiante.
- Ne pas les mettre dans un pilulier ; les conserver dans leur emballage d'origine.



1. Entretien initial

Connaissez-vous la conduite à tenir en cas d'oubli ?

A PA NA

- **COTELLIC® cobimétinib** : prendre la dose oubliée dès que possible sauf si la dose suivante (celle du lendemain) est prévue dans les **12 prochaines heures** ; dans ce cas, ne pas prendre la dose manquée et poursuivre le traitement à l'heure et à la dose habituelles de la prise suivante (ne pas doubler la dose).
- **ZELBORAF® vémurafénib** : prendre la dose oubliée dès que possible sauf si la dose suivante est prévue dans les **4 prochaines heures** ; dans ce cas, ne pas prendre la dose manquée et poursuivre le traitement à l'heure et à la dose habituelles de la prise suivante (ne pas doubler la dose).

Connaissez-vous la conduite à tenir en cas de vomissement ?

A PA NA

Ne pas prendre de nouvelle dose, poursuivre le traitement à l'heure et à la dose habituelles de la prise suivante (ne pas doubler la dose).

Connaissez-vous les précautions générales à prendre lors de votre passage aux toilettes ?

A PA NA

- Uriner assis sur les toilettes. Rabattre l'abattant avant de tirer la chasse d'eau complètement.
- Se laver les mains à l'eau savonneuse.
- Nettoyer régulièrement le bouton poussoir de la chasse d'eau, la cuvette, la lunette et l'abattant des toilettes ainsi que le sol.

Connaissez-vous les précautions générales à prendre lorsque du linge (vêtement, drap) est souillé par un liquide corporel ou des sécrétions (vomissement, sang, urine, sperme, selles) ?

A PA NA

- Laver le linge souillé immédiatement et séparément à température élevée (60-90°C).
- Se laver les mains à l'eau savonneuse après contact.

Connaissez-vous les précautions à prendre en cas de relations sexuelles ?

A PA NA

Femme en âge de procréer : utiliser 2 méthodes efficaces de contraception, telles qu'une méthode barrière (préservatif masculin ou diaphragme, avec spermicide si disponible) et une autre méthode contraceptive, durant le traitement et pendant au moins 6 mois après son arrêt. Le vémurafénib peut diminuer l'efficacité des contraceptifs hormonaux.

- **COTELLIC® cobimétinib** (§ 4.2 RCP) : « utiliser 2 méthodes efficaces de contraception, telles qu'un préservatif ou une autre méthode barrière (avec spermicide si disponible) durant le traitement et pendant au moins 3 mois à la suite de son arrêt ».
- **ZELBORAF® vémurafénib** (§ 4.2 RCP) : « utiliser une contraception efficace pendant le traitement et au moins 6 mois après l'arrêt du traitement. Le vémurafénib peut diminuer l'efficacité des contraceptifs hormonaux ».



1. Entretien initial

CONCLUSION POUR LE PATIENT

Avez-vous des questions ? Si oui, lesquelles ?



1. Entretien initial

SYNTHÈSE

Entretien du : Durée (approximative) :

- **INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE PATIENT**

- **ÉVALUATION DE L'APPROPRIATION DU TRAITEMENT ET OBSERVANCE** (ressenti et connaissances)

- **MODALITÉS D'ADMINISTRATION**
(schéma et règles de prise, conservation, conduite à tenir en cas d'oubli / vomissement, précautions d'hygiène)

Appréciation du pharmacien sur le niveau d'information du patient

Prévoir la présence d'un accompagnement pour l'entretien suivant ? OUI NON

Prévoir l'orientation du patient vers le prescripteur ? OUI NON

Prévoir une prise de contact avec le prescripteur ? OUI NON

Le prochain entretien abordera le thème « **Vie quotidienne et gestion des effets indésirables** » et aura lieu le : (en cas de survenue précoce d'effets indésirables, ce rendez-vous peut être avancé).



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

NOM Prénom

Date de naissance [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Poids, Taille, IMC.....

Date de l’entretien [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Nom du pharmacien

Lors de cet entretien, le pharmacien évoque avec le patient les difficultés qu’il rencontre dans sa vie quotidienne en lien avec son traitement, ainsi que les éventuels effets indésirables auxquels il est confronté ; il s’agit d’un entretien thématique consacré à la vie quotidienne du patient et aux effets secondaires qu’il rencontre.

OUTILS



[Fiche médicament VOC Professionnels de santé](#)



[Fiche médicament VOC Patient](#)

VIE QUOTIDIENNE : DIFFICULTÉS LIÉES AU TRAITEMENT

Connaissez-vous les règles générales et les conseils hygiéno-diététiques à respecter en lien avec votre traitement ?

A PA NA

- Boire 2L d’eau par jour.
- Limiter sa consommation d’alcool.
- Ne pas s’exposer au soleil.
- Prendre **Cobimétinib COTELLIC®** et **Vémurafénib ZELBORAF®** avec ou sans nourriture, à heure fixe, avec un grand verre d’eau.
Pour le vémurafénib, il est recommandé d’éviter les prises à jeun, c’est-à-dire que les prises doivent avoir lieu moins de 30 min avant un repas ou moins d’1h30 après un repas.
- Ne pas écraser, mâcher, sucer ou couper les comprimés.
- Toujours se laver les mains à l’eau savonneuse avant et après manipulation de ces médicaments et après être allé aux toilettes.
- Ne jamais prendre de médicaments / produits d’automédication sans consulter son médecin ou demander l’avis de son pharmacien.
- Lansoprazole (inhibiteur puissant de la P-gp) : éviter la prise (risque d’augmentation des concentrations plasmatiques du cobimétinib et du vémurafénib).
- Topiques gastro-intestinaux : respecter un intervalle minimum de 2h.
- Eviter les médicaments (ex : ibuprofène, aspirine) et les produits de phytothérapie pouvant favoriser les saignements.
- Millepertuis : éviter la prise (risque de diminution de l’efficacité du cobimétinib et du vémurafénib).
- Ne pas consommer de pamplemousse, pomelo, orange de Séville, carambole, réglisse, Chardon-Marie, curcuma.
- D’autres substances présentes dans les plantes, tisanes, huiles essentielles, probiotiques ou compléments alimentaires peuvent interférer avec cobimétinib et vémurafénib : vérifier systématiquement leur compatibilité auprès de votre pharmacien.
- Contre-indication aux vaccins vivants atténués

Comment vivez-vous votre traitement ?



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

Avez-vous des RDV très réguliers avec les services hospitaliers ?

Le patient a-t-il le sentiment d'être éloigné du monde médical du fait de la voie d'administration de son traitement ?

OUI NON

Ressentez-vous le besoin d'avoir une aide extérieure

(psychologique, aide au quotidien) ?

OUI NON

DÉPISTAGE / GESTION DES EFFETS INDÉSIRABLES (EI)

Avez-vous ressenti un EI qui serait lié à votre traitement ? *Une interruption ou un arrêt du traitement doit être envisagé(e) chez les patients présentant une toxicité de grade 2 intolérable ou plus (classification NCI-CTCAE) selon le cas (§ 4.2 RCP).*

• **Nausées**

- Non
- Grade 1* : Perte d'appétit
- Grade 2* : Baisse des prises alimentaires sans perte significative de poids
- Grade 3* : Apport calorique oral et apport hydrique insuffisants

• **Vomissements**

- Non
- Grade 1* : 1 - 2 épisodes (espacés de 5 minutes) en 24 h
- Grade 2* : 3 - 5 épisodes (espacés de 5 minutes) en 24 h
- Grade 3* : ≥ 6 épisodes (espacés de 5 minutes) en 24 h

• **Déshydratation** *(imputable au COTELLIC® cobimétinib)*

- Non
- Grade 1* : Nécessitant une augmentation des apports liquidiens oraux ; sécheresse des muqueuses
- Grade 2* : Nécessitant une réhydratation par perfusion pendant moins de 24 h
- Grade 3* : Nécessitant une réhydratation par perfusion ou une hospitalisation

• **Perte de poids** *(imputable au ZELBORAF® vémurafénib)*

- Non
- Grade 1* : 5 - 10% de la valeur de base ; ne nécessitant aucun traitement
- Grade 2* : 10 - 20% de la valeur de base ; nécessitant un support nutritionnel
- Grade 3* : ≥ 20 % de la valeur de base ; nécessitant une sonde de nutrition entérale / nutrition parentérale

• **Anorexie** *(imputable au vémurafénib)*

- Non
- Grade 1* : Perte d'appétit mais sans modification des habitudes alimentaires
- Grade 2* : Prise alimentaire altérée sans perte de poids significative ; supplémentation nutritionnelle orale
- Grade 3* : Perte de poids significative ou malnutrition (ex : apport calorique ou liquidien insuffisant)

• **Dysgueusie** *(imputable au vémurafénib)*

- Non
- Grade 1* : Trouble du goût sans modification du régime alimentaire
- Grade 2* : Trouble du goût et modification du régime alimentaire (*supplémentation orale*) ; perte du goût

• **Diarrhée**

- Non
- Grade 1* : Augmentation de 1 à 4 du nombre de selles par jour par rapport à l'état initial
- Grade 2* : Augmentation de 4 à 6 du nombre de selles par jour par rapport à l'état initial
- Grade 3* : Augmentation de 7 ou plus du nombre de selles par jour par rapport à l'état initial



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

- **Constipation** (*imputable au vémurafénib*)
 - Non
 - Grade 1 : Symptômes occasionnels ou intermittents
 - Grade 2 : Symptômes persistants avec utilisation régulière de laxatifs ou de lavements
 - Grade 3 : Constipation opiniâtre avec nécessité d'évacuation manuelle
- **Arthralgie** (*imputable au vémurafénib*)
 - Non
 - Grade 1 : Douleur légère
 - Grade 2 : Douleur modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
 - Grade 3 : Douleur sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne
- **Arthrite** (*imputable au vémurafénib*)
 - Non
 - Grade 1 : Douleur légère avec inflammation, érythème, ou gonflement articulaire
 - Grade 2 : Douleur modérée avec signes d'inflammation, érythème ou gonflement articulaire
 - Grade 3 : Douleur sévère, inflammation, érythème ou gonflement articulaire ; dommages irréversibles
- **Douleur dorsale** (*imputable au vémurafénib*)
 - Non
 - Oui
- **Myalgie** (*imputable au vémurafénib*)
 - Non
 - Grade 1 : Douleur légère
 - Grade 2 : Douleur modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
 - Grade 3 : Douleur sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne
- **Douleur musculosquelettique** (*imputable au vémurafénib*)
 - Non
 - Oui
- **Douleur des extrémités** (*imputable au vémurafénib*)
 - Non
 - Grade 1 : Douleur légère
 - Grade 2 : Douleur modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
 - Grade 3 : Douleur sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne
- **Syndrome main-pied** (*rougeur, gêne marquée, gonflement et picotements ; imputable au vémurafénib*)
 - Non
 - Grade 1 : Modifications légères de la peau voire érythème, œdème ou hyperkératose ; sans douleur
 - Grade 2 : Modifications cutanées (*exfoliation, bulles, saignement, œdème, hyperkératose*) avec douleur
 - Grade 3 : Modifications cutanées sévères avec douleur
- **Frissons** (*imputable au cobimétinib*)
 - Non
 - Grade 1 : Sensation légère de froid ; frissons ; claquement des dents
 - Grade 2 : Tremblements modérés de l'ensemble du corps ; nécessitant un traitement par morphiniques
 - Grade 3 : Sévère ou prolongé ne répondant pas au traitement par morphiniques
- **Neuropathie périphérique** (*imputable au vémurafénib*)
 - Non
 - Oui
- **Eruption cutanée** (*apparition de tâches ou d'éléments figurés*)
 - Non
 - Oui
- **Erythème** (*rougeur des téguments disparaissant à la pression ; imputable au vémurafénib*)
 - Non
 - Oui



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

- **Photosensibilité** (*imputable au vémurafénib*)
 - Non
 - Grade 1 : Érythème indolore et couvrant < 10 % de la surface corporelle
 - Grade 2 : Érythème sensible et couvrant 10 – 30 % de la surface corporelle
 - Grade 3 : Érythème couvrant > 30 % de la surface corporelle et érythème avec bulles
- **Prurit** (*imputable au vémurafénib*)
 - Non
 - Grade 1 : Léger ou localisé ; nécessitant un traitement topique
 - Grade 2 : Intense ou étendu ; intermittent ; lésions de grattage ; nécessitant un traitement oral
 - Grade 3 : Constant ; nécessitant un traitement par corticoïdes per os ou immunosuppresseur
- **Papillome cutané** (*imputable au vémurafénib*)
 - Non
 - Oui
- **Dermatite acnéiforme** (*imputable au cobimétinib*)
 - Non
 - Oui
- **Sécheresse cutanée** (*imputable au vémurafénib*)
 - Non
 - Grade 1 : Couvrant < 10% de la surface corporelle, sans érythème ni prurit
 - Grade 2 : Couvrant 10 - 30% de la surface corporelle et associée avec un érythème ou un prurit
 - Grade 3 : Couvrant > 30% de la surface corporelle et associée avec un érythème ou un prurit
- **Hyperkératose**
 - Non
 - Oui
- **Alopécie** (*imputable au vémurafénib*)
 - Non
 - Grade 1 : Perte des cheveux \geq 50%, non visible à distance mais visible de près
 - Grade 2 : Perte de cheveux > 50%, visible
- **Œdème périphérique** (*imputable au vémurafénib*)
 - Non
 - Oui
- **Hypertension** (*imputable au cobimétinib*)
 - Non
 - Grade 1 : Pré-hypertension (PA systolique 120-139 mm Hg ou PA diastolique 80-89 mm Hg)
 - Grade 2 : PAS 140-159 mm Hg ou PAD 90-99 mm Hg ; nécessitant un traitement médical
 - Grade 3 : PAS \geq 160 mm Hg ou PAD \geq 100 mm Hg ; nécessitant un traitement médical plus intensif
- **Fatigue** (*imputable au vémurafénib*)
 - Non
 - Grade 1 : Cédant avec le repos
 - Grade 2 : Ne cédant pas avec le repos ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
 - Grade 3 : Ne cédant pas avec le repos ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne
- **Maux de tête** (*imputable au vémurafénib*)
 - Non
 - Grade 1 : Douleur légère
 - Grade 2 : Douleur modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
 - Grade 3 : Douleur sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne
- **Vertiges** (*imputable au vémurafénib*)
 - Non
 - Grade 1 : Symptômes légers
 - Grade 2 : Symptômes modérés ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
 - Grade 3 : Symptômes sévères ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

- **Uvéïte** (*imputable au vémurafénib*)
 - Non
 - Oui
- **Trouble de la vision** (*imputable au cobimétinib*)
 - Non
 - Oui
- **Déficience visuelle** (*imputable au cobimétinib*)
 - Non
 - Oui
- **Saignements/Hémorragies** (*imputable au cobimétinib*)
 - Non
 - Oui
- **Toux** (*imputable au vémurafénib ; ou potentiel signe évocateur d'une pneumopathie imputable au cobimétinib*)
 - Non
 - Grade 1 : Symptômes légers ; ne nécessitant aucun traitement
 - Grade 2 : Symptômes modérés ; nécessitant un traitement
 - Grade 3 : Symptômes sévères ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne
- **Dyspnée** (*potentiel signe évocateur d'une pneumopathie imputable au cobimétinib*)
 - Non
 - Grade 1 : Essoufflement lors d'un effort modéré
 - Grade 2 : Essoufflement lors d'un effort minime
 - Grade 3 : Essoufflement au repos
- **Pyrexie**
 - Non
 - Oui
- **Infections** (*folliculite ; imputable au vémurafénib*)
 - Non
 - Oui
- **Autres :**



2. Entretien “**Vie quotidienne et gestion des effets indésirables**”

Ces EI perturbent-ils vos capacités physiques (marche, port de charges) ?

OUI NON

Ces EI ont-ils un impact sur vos activités de loisir et de temps libre ?

OUI NON

Ces EI ont-ils un impact sur vos tâches quotidiennes ?

OUI NON

À combien quantifiez-vous votre douleur de 0 à 10 (douleurs ostéoarticulaires, musculaires, neuropathiques) ? [Echelles de mesure de la douleur \(HAS 2020\)](#)

Présentez-vous une modification de votre appétit ?
Si oui, identifiez-vous une cause ?

OUI NON

CONCLUSION POUR LE PATIENT

Avez-vous des questions ? Si oui, lesquelles ?



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

SYNTHÈSE

Entretien du : Durée (approximative) :

- **VIE QUOTIDIENNE** (difficultés liées au traitement)

- **DÉPISTAGE / GESTION / IMPACT DES EI**

Appréciation du pharmacien sur le niveau d’information du patient

Prévoir la présence d’un accompagnement pour l’entretien suivant ?

OUI NON

Prévoir l’orientation du patient vers le prescripteur ?

OUI NON

Prévoir une prise de contact avec le prescripteur ?

OUI NON

Le cas échéant, déclarer les EI sur le portail : signalement-sante-gouv.fr

Le prochain entretien abordera le thème « **Observance** » et aura lieu le :



3. Entretien « Observance »

Questionnaire de GIRERD

A. Ce matin, avez-vous oublié de prendre votre médicament ?

OUI = 0 NON = 1

B. Depuis la dernière consultation, avez-vous été en panne de médicament ?

OUI = 0 NON = 1

C. Vous est-il arrivé de prendre votre traitement avec retard par rapport à l'heure habituelle ?

OUI = 0 NON = 1

D. Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains jours, votre mémoire vous fait défaut ?

OUI = 0 NON = 1

E. Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains jours, vous avez l'impression que votre traitement vous fait plus de mal que de bien ?

OUI = 0 NON = 1

F. Pensez-vous que vous avez trop de comprimés à prendre ?

OUI = 0 NON = 1

Score d'observance :

= 6 bonne observance
= 4-5 faible observance
≤ 3 non observance

Quelles sont les précautions à prendre lorsque vous allez aux toilettes et en cas de linge souillé par fluide corporel ?

A PA NA

- Uriner assis sur les toilettes. Rabattre l'abattant avant de tirer la chasse d'eau complètement.
- Nettoyer régulièrement le bouton poussoir de la chasse d'eau, la cuvette, la lunette et l'abattant des toilettes ainsi que le sol.
- Laver le linge souillé immédiatement et séparément à température élevée (60-90°C).
- Se laver les mains à l'eau savonneuse.

Quelles sont les précautions à prendre en cas de relations sexuelles ?

A PA NA

Femme en âge de procréer : utiliser 2 méthodes efficaces de contraception, telles qu'une méthode barrière (préservatif masculin ou diaphragme, avec spermicide si disponible) et une autre méthode contraceptive, durant le traitement et pendant au moins 6 mois après son arrêt. Le vémurafénib peut diminuer l'efficacité des contraceptifs hormonaux.

- *COTELLIC® cobimétinib (§ 4.2 RCP) : « utiliser 2 méthodes efficaces de contraception, telles qu'un préservatif ou une autre méthode barrière (avec spermicide si disponible) durant le traitement et pendant au moins 3 mois à la suite de son arrêt ».*
- *ZELBORAF® vémurafénib (§ 4.2 RCP) : « utiliser une contraception efficace pendant le traitement et au moins 6 mois après l'arrêt du traitement. Le vémurafénib peut diminuer l'efficacité des contraceptifs hormonaux ».*



3. Entretien « Observance »

CONCLUSION POUR LE PATIENT

Avez-vous des questions ? Si oui, lesquelles ?



3. Entretien « Observance »

SYNTHÈSE

Entretien du : Durée (approximative) :

Appréciation du pharmacien sur le niveau d'information du patient

Prévoir la présence d'un accompagnement pour l'entretien suivant ? OUI NON

Prévoir l'orientation du patient vers le prescripteur ? OUI NON

Prévoir une prise de contact avec le prescripteur ? OUI NON

Le prochain entretien abordera le thème de la « **Vie quotidienne et gestion des effets indésirables** »
et aura lieu le :