



1. Entretien initial

En amont de l'entretien initial, le pharmacien procède à l'**analyse des interactions** entre la thérapie anticancéreuse du patient et l'ensemble de ses traitements. Il prépare un **plan de prise personnalisé**. Il lui appartient également de s'approprier les questions des grilles d'entretien présentes dans les fiches de suivi.

Lors de l'entretien initial, le pharmacien adopte une posture d'écoute et d'accompagnement pertinente, adaptée aux besoins du patient ; il utilise un langage adéquat.

Il recueille les informations générales relatives au patient et évalue ses connaissances vis-à-vis du traitement, notamment au regard des informations qu'il a reçues du médecin. Il renouvelle son analyse en tenant compte du régime alimentaire du patient, de son recours à l'automédication, à l'homéopathie, aux compléments alimentaires, aux huiles essentielles (aromathérapie), etc... Il l'informe des modalités de prise de son traitement.

- Le pharmacien évalue la compréhension des informations qu'il délivre à son patient lors des entretiens. Ainsi, le pharmacien considère qu'une notion est :
 - **acquise** dès lors qu'elle est parfaitement intégrée par le patient et que ce dernier est capable de la restituer avec ses propres termes et de la mettre en pratique,
 - **partiellement acquise** dès lors que le patient a des connaissances incomplètes ou imprécises,
 - **non acquise** dès lors que le patient n'a aucune connaissance sur le sujet.
- Le pharmacien propose d'ouvrir au patient, le cas échéant, son dossier pharmaceutique (DP) selon les dispositions réglementaires en vigueur, dans le respect du libre choix du patient d'accepter ou non l'ouverture. **Il rappelle l'utilité du DP et du dossier médical partagé (DMP)** pour détecter d'éventuelles interactions médicamenteuses, optimiser l'analyse des interactions médicamenteuses possibles, coordonner le suivi du patient avec ses prescripteurs, et permettre aux professionnels participant à la prise en soins d'y inscrire les nouvelles prescriptions (DP, DMP) et suivis biologiques (DMP), ce qui favorisera la **transmission** et la **traçabilité des données entre la ville et l'hôpital**. Il est aussi important pour le pharmacien de consulter, lorsqu'ils en ont la possibilité, les documents du parcours de soins du patient contenus dans le dossier communiquant de cancérologie (DCC) : réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) et programme personnalisé de soins (PPS).

BOÎTE À OUTILS



[Bulletin d'adhésion et de désignation du pharmacien](#)



[Fiche médicament VOC Professionnels de santé](#)



[Fiche médicament VOC Patient](#)



1. Entretien initial

Habitudes de vie :

(alimentation, alcool, tabac, activité physique, sport de contact, activité manuelle, déplacement, voyage...)

Allergies et intolérances :

IMBRUVICA® comprimé contient du lactose. Les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit total en lactase ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ne doivent pas prendre ce médicament.

Identification des situations nécessitant assistance (difficultés motrices, sensorielles, cognitives) :

Coordonnées du médecin traitant, de l'oncologue et du service d'oncologie :

Informations reçues concernant l'offre de soins (supports éventuels, dispositif d'annonce de la maladie, échanges avec un professionnel de santé, réseau régional ou territorial de cancérologie, établissement réalisant les soins) :

- Le pharmacien doit rappeler au patient que l'automédication n'est pas recommandée** du fait des interactions médicamenteuses potentielles, et que l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien est nécessaire avant tout nouveau traitement, qu'il soit soumis à prescription ou non.

- Le pharmacien informe également le patient sur les contre-indications** (médicamenteuses, vaccinales, alimentaires). La connaissance des habitudes alimentaires du patient et des comportements de santé (caractéristiques de son régime alimentaire, utilisation de compléments alimentaires, aromathérapie, prise de médicaments dispensés sans ordonnance, etc...) aidera également le pharmacien à prodiguer un conseil adapté.



1. Entretien initial

ÉVALUATION DE L'APPROPRIATION DU TRAITEMENT

À quoi sert votre médicament ?

Traitement

- du lymphome à cellules du manteau en rechute ou réfractaire, en monothérapie
- de la leucémie lymphoïde chronique, en monothérapie ou en association
- de la macroglobulinémie de Waldenström, en monothérapie ou en association

- A (acquis)
- PA (partiellement acquis)
- NA (non acquis)

À quelle dose vous a-t-il été prescrit ?

- A PA NA

Quels sont les médicaments à ne pas associer à votre traitement ?

- Topiques gastro-intestinaux : respecter un intervalle minimum de 2h.
- Éviter les médicaments pouvant favoriser les saignements (ex : ibuprofène, aspirine).
- Millepertuis : ne pas consommer (risque de diminution de l'efficacité de l'ibrutinib).

- A PA NA

Quels sont les aliments à ne pas associer à votre traitement ?

- Millepertuis : ne pas consommer (risque de diminution de l'efficacité de l'ibrutinib).
- Ne pas consommer de pamplemousse, pomelo, orange de Séville, carambole, réglisse, Chardon-Marie, curcuma.
- Éviter les produits de phytothérapie pouvant favoriser les saignements.
- D'autres substances présentes dans les plantes, tisanes, huiles essentielles, probiotiques ou compléments alimentaires peuvent interférer avec l'ibrutinib : vérifier systématiquement leur compatibilité auprès de votre pharmacien

- A PA NA

Connaissez-vous la conduite à tenir vis-à-vis de l'emballage vide de votre traitement, voire des éventuel(le)s comprimés / gélules qu'il vous resterait ?

À rapporter en pharmacie dans un sachet pour destruction conformément à la procédure en vigueur ; ne pas jeter au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères.

- A PA NA

Comment percevez-vous votre pathologie et le traitement que l'on vous a prescrit ?

Quel est votre ressenti par rapport à sa voie d'administration ? Perception possible d'un sentiment d'isolement voire d'abandon du fait d'un encadrement différent de celui d'une chimiothérapie par voie injectable, impression d'efficacité moindre de la forme orale par rapport à une forme injectable.



1. Entretien initial

Votre médecin traitant est-il informé que vous êtes sous anticancéreux oral ?

OUI NON

Connaissez-vous l'importance de respecter les prescriptions et recommandations de votre médecin (observance) ?

A PA NA

L'efficacité optimale du traitement dépend en grande partie de la capacité du patient à bien le suivre. Oublis, décalages du traitement, augmentation ou baisse de la posologie sans avis médical peuvent diminuer l'efficacité du traitement ou majorer les effets indésirables.

Connaissez-vous l'importance de la surveillance de votre traitement ?

A PA NA

Elle permet de s'assurer de l'efficacité thérapeutique du traitement et de détecter d'éventuels effets secondaires, parfois source d'ajustement/modification du traitement.

MODALITÉS D'ADMINISTRATION ET PRECAUTIONS GENERALES

Connaissez-vous le schéma de prise de votre traitement ?

A PA NA

Traitement en continu, en 1 prise par jour

Connaissez-vous les règles de prise de votre médicament ?

A PA NA

- Prise à heure fixe, si possible avec de la nourriture (amélioration de l'absorption), avec un grand verre d'eau
- Ne pas ouvrir, écraser ou mâcher les gélules ; ne pas écraser, mâcher, sucer ou couper les comprimés.
- Toujours se laver les mains à l'eau savonneuse avant et après manipulation de ces médicaments et après être allé aux toilettes.

Connaissez-vous les règles de conservation de votre médicament ?

A PA NA

- Stocker hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux domestiques, à l'écart des autres médicaments du foyer et de toute nourriture.
- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité, à température ambiante.
- Ne pas le mettre dans un pilulier ; le conserver dans son emballage d'origine.

Connaissez-vous la conduite à tenir en cas d'oubli ?

A PA NA

Prendre la dose oubliée dès que possible le jour-même ; poursuivre le traitement à l'heure et à la dose habituelles le lendemain (ne pas doubler la dose).

Connaissez-vous la conduite à tenir en cas de vomissement ?

A PA NA

Ne pas prendre de nouvelle dose, poursuivre le traitement à l'heure et à la dose habituelles de la prise suivante (ne pas doubler la dose).



1. Entretien initial

Connaissez-vous les précautions générales à prendre lors de votre passage aux toilettes ?

A PA NA

- Uriner assis sur les toilettes. Rabattre l'abattant avant de tirer la chasse d'eau complètement.
- Se laver les mains à l'eau savonneuse.
- Nettoyer régulièrement le bouton poussoir de la chasse d'eau, la cuvette, la lunette et l'abattant des toilettes ainsi que le sol.

Connaissez-vous les précautions générales à prendre lorsque du linge (vêtement, drap) est souillé par un liquide corporel ou des sécrétions (vomissement, sang, urine, sperme, selles) ?

A PA NA

- Laver le linge souillé immédiatement et séparément à température élevée (60-90°C).
- Se laver les mains à l'eau savonneuse après contact.

Connaissez-vous les précautions à prendre en cas de relations sexuelles ?

A PA NA

Femme en âge de procréer : utiliser des méthodes de contraception hautement efficaces pendant le traitement et durant les 3 mois qui suivent son arrêt.



1. Entretien initial

CONCLUSION POUR LE PATIENT

Avez-vous des questions ? Si oui, lesquelles ?



1. Entretien initial

SYNTHÈSE

Entretien du : Durée (approximative) :

- **INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE PATIENT**

- **ÉVALUATION DE L'APPROPRIATION DU TRAITEMENT** (ressenti et connaissances)

- **MODALITÉS D'ADMINISTRATION** (schéma et règles de prise, conservation, conduite à tenir en cas d'oubli / vomissement) **ET PRECAUTIONS GÉNÉRALES**

Appréciation du pharmacien sur le niveau d'information du patient

Prévoir la présence d'un accompagnant pour l'entretien suivant ? OUI NON

Prévoir l'orientation du patient vers le prescripteur ? OUI NON

Prévoir une prise de contact avec le prescripteur ? OUI NON

Le prochain entretien abordera le thème « **Vie quotidienne et gestion des effets indésirables** » et aura lieu le : (en cas de survenue précoce d'effets indésirables, ce rendez-vous peut être avancé).



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

Avez-vous des RDV très réguliers avec les services hospitaliers ?

Le patient a-t-il le sentiment d'être éloigné du monde médical du fait de la voie d'administration de son traitement ?

OUI NON

Ressentez-vous le besoin d'avoir une aide extérieure
(psychologique, aide au quotidien) ?

OUI NON

EFFETS INDÉSIRABLES (EI) ET IMPACTS

Avez-vous ressenti un EI qui serait lié à votre traitement ? Une interruption ou un arrêt du traitement doit être envisagé(e) chez les patients présentant une toxicité de grade 3 ou plus selon le cas (classification NCI-CTCAE ; § 4.2 RCP).

• Nausées

- Non
- Grade 1 : Perte d'appétit
- Grade 2 : Baisse des prises alimentaires sans perte significative de poids
- Grade 3 : Apport calorique oral et apport hydrique insuffisants

• Vomissements

- Non
- Grade 1 : 1 - 2 épisodes (espacés de 5 minutes) en 24 h
- Grade 2 : 3 - 5 épisodes (espacés de 5 minutes) en 24 h
- Grade 3 : ≥ 6 épisodes (espacés de 5 minutes) en 24 h

• Stomatite (*inflammation de la muqueuse buccale*)

- Non
- Oui

• Diarrhée

- Non
- Grade 1 : Augmentation de 1 à 4 du nombre de selles par jour par rapport à l'état initial
- Grade 2 : Augmentation de 4 à 6 du nombre de selles par jour par rapport à l'état initial
- Grade 3 : Augmentation de 7 ou plus du nombre de selles par jour par rapport à l'état initial

• Constipation

- Non
- Grade 1 : Symptômes occasionnels ou intermittents
- Grade 2 : Symptômes persistants avec utilisation régulière de laxatifs ou de lavements
- Grade 3 : Constipation opiniâtre avec nécessité d'évacuation manuelle

• Arthralgie

- Non
- Grade 1 : Douleur légère
- Grade 2 : Douleur modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
- Grade 3 : Douleur sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne

• Contracture musculaire

- Non
- Oui



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

- **Douleur musculosquelettique**
 - Non
 - Oui
- **Neuropathie périphérique**
 - Non
 - Grade 2* : Douleur modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
 - Grade 3* : Douleur sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne
- **Rash (éruption transitoire)**
 - Non
 - Oui
- **Erythème (rougeur des téguments disparaissant à la pression)**
 - Non
 - Oui
- **Urticaire (éruption cutanée prurigineuse avec des papules à intérieur pâle et bords rouges bien marqués)**
 - Non
 - Grade 1* : Lésions couvrant < 10 % de la surface corporelle ; nécessitant un traitement topique
 - Grade 2* : Lésions couvrant 10 – 30 % de la surface corporelle ; nécessitant un traitement oral
 - Grade 3* : Lésions couvrant > 30 % de la surface corporelle ; nécessitant un traitement IV
- **Pétéchie**
 - Non
 - Oui
- **Onychoclasie**
 - Non
 - Oui
- **Œdème périphérique**
 - Non
 - Oui
- **Hypertension**
 - Non
 - Grade 1* : Pré-hypertension (PA systolique 120-139 mm Hg ou PA diastolique 80-89 mm Hg)
 - Grade 2* : PAS 140-159 mm Hg ou PAD 90-99 mm Hg ; nécessitant un traitement médical
 - Grade 3* : PAS ≥ 160 mm Hg ou PAD ≥ 100 mm Hg ; nécessitant un traitement médical plus intensif
- **Palpitations**
 - Non
 - Grade 1* : Symptômes légers ; ne nécessitant aucun traitement
 - Grade 2* : Nécessitant un traitement
- **Maux de tête**
 - Non
 - Grade 1* : Douleur légère
 - Grade 2* : Douleur modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
 - Grade 3* : Douleur sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne
- **Vertiges**
 - Non
 - Grade 1* : Symptômes légers
 - Grade 2* : Symptômes modérés ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
 - Grade 3* : Symptômes sévères ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne
- **Trouble de la vision**
 - Non
 - Oui
- **Ecchymoses**
 - Non
 - Oui



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

- **Epistaxis**

- Non
- Grade 1* : Symptômes légers ; ne nécessitant aucun traitement
- Grade 2* : Symptômes modérés ; nécessitant un traitement médical

- **Saignements/Hémorragies**

- Non
- Oui

- **Toux**

- Non
- Grade 1* : Symptômes légers ; ne nécessitant aucun traitement
- Grade 2* : Symptômes modérés ; nécessitant un traitement
- Grade 3* : Symptômes sévères ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne

- **Dyspnée**

- Non
- Grade 1* : Essoufflement lors d'un effort modéré
- Grade 2* : Essoufflement lors d'un effort minime
- Grade 3* : Essoufflement au repos

- **Pyrexie**

- Non
- Oui

- **Infections**

- Non
- Oui

- **Autres :**



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

Ces EI perturbent-ils vos capacités physiques (marche, port de charges) ?

OUI NON

Ces EI ont-ils un impact sur vos activités de loisir et de temps libre ?

OUI NON

Ces EI ont-ils un impact sur vos tâches quotidiennes ?

OUI NON

À combien quantifiez-vous votre douleur de 0 à 10 (douleurs ostéoarticulaires, musculaires, neuropathiques) ? [Echelles de mesure de la douleur \(HAS 2020\)](#)

Présentez-vous une modification de votre appétit ?
Si oui, identifiez-vous une cause ?

OUI NON



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

CONCLUSION POUR LE PATIENT

Avez-vous des questions ? Si oui, lesquelles ?



3. Entretien « Observance »

Questionnaire de GIRERD

A. Ce matin, avez-vous oublié de prendre votre médicament ?

OUI = 0 NON = 1

B. Depuis la dernière consultation, avez-vous été en panne de médicament ?

OUI = 0 NON = 1

C. Vous est-il arrivé de prendre votre traitement avec retard par rapport à l'heure habituelle ?

OUI = 0 NON = 1

D. Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains jours, votre mémoire vous fait défaut ?

OUI = 0 NON = 1

E. Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains jours, vous avez l'impression que votre traitement vous fait plus de mal que de bien ?

OUI = 0 NON = 1

F. Pensez-vous que vous avez trop de comprimés/gélules à prendre ?

OUI = 0 NON = 1

Score d'observance :

= 6 bonne observance
= 4-5 faible observance
≤ 3 non observance

Quelles sont les précautions à prendre lorsque vous allez aux toilettes et en cas de linge souillé par fluide corporel ?

A PA NA

- Uriner assis sur les toilettes. Rabattre l'abattant avant de tirer la chasse d'eau complètement.
- Nettoyer régulièrement le bouton poussoir de la chasse d'eau, la cuvette, la lunette et l'abattant des toilettes ainsi que le sol.
- Laver le linge souillé immédiatement et séparément à température élevée (60-90°C).
- Se laver les mains à l'eau savonneuse.

Quelles sont les précautions à prendre en cas de relations sexuelles ?

A PA NA

Femme en âge de procréer : utiliser des méthodes de contraception hautement efficaces pendant le traitement et durant les 3 mois qui suivent son arrêt.



3. Entretien « Observance »

CONCLUSION POUR LE PATIENT

Avez-vous des questions ? Si oui, lesquelles ?



3. Entretien « Observance »

SYNTHÈSE

Entretien du : Durée (approximative) :

Appréciation du pharmacien sur le niveau d'information du patient

Prévoir la présence d'un accompagnant pour l'entretien suivant ? OUI NON

Prévoir l'orientation du patient vers le prescripteur ? OUI NON

Prévoir une prise de contact avec le prescripteur ? OUI NON

Le prochain entretien abordera le thème de la « **Vie quotidienne et gestion des effets indésirables** »
et aura lieu le :