


Médicaments antipsychotiques dans un contexte d'agitation complexe en chambre d'isolement

Quelle problématique ?



Risque de surdosage en médicaments antipsychotiques dans un contexte d'agitation complexe en chambre d'isolement chez un patient chronique traité par antipsychotiques dont la clozapine



Quels produits de santé ?

- Antipsychotiques à forte dose
- Association d'antipsychotiques

Cas clinique



Qui ?

Patient bipolaire de 60 ans
Comorbidités : Obésité grade 2 avec syndrome restrictif



Quoi ?

Clozapine & Traitement associant plusieurs antipsychotiques à posologies élevées et une benzodiazépine orale



Où et quand ?

Prise en soins en chambre d'isolement suite à un passage à l'acte hétéroagressif sur l'équipe soignante ; l'unité de soins accueillant le patient n'est pas son unité de référence



Pourquoi ?

Monsieur P, suivi en psychiatrie depuis de nombreuses années est hospitalisé depuis plusieurs semaines. Il semble très envahi, délirant, peu accessible avec une sthénicité sous-jacente. De ce fait, Monsieur P passe plusieurs semaines en chambre d'isolement. De nombreux prescripteurs interviennent dans sa prise en charge. Le traitement est modifié plusieurs fois afin de rechercher un apaisement de la symptomatologie du patient avec, notamment, une escalade thérapeutique. En parallèle, l'état de santé du patient évolue. On lui diagnostique une rhabdomyolyse, sans insuffisance rénale aiguë, rhabdomyolyse régressive par la suite. Quelques jours plus tard, le patient présente une hypothermie et un encombrement trachéo-bronchique sans foyer auscultatoire ni dyspnée. Ses pupilles sont symétriques mais en myosis serré du fait de l'imprégnation neuroleptique, pas de miction signalée. Décision médicale de ne plus administrer de psychotrope.

Conséquences

Bien que l'état du patient se soit partiellement amélioré (retour au calme, amélioration de la saturation mais encombrement toujours présent), l'équipe soignante constate quelques heures après que le patient est dans le coma.

Suspicion pneumopathie d'inhalation et coma initial sur probable surdosage en neuroleptiques

L'interne de garde intervient immédiatement et demande le transfert aux urgences.

Date de l'atelier :	Animateur :
Nom des participants :	
▪	▪
▪	▪
▪	▪

Analyse

Facteurs contributifs

-
-
-
-
-
-
-
-

Actions correctives & immédiates

-
-
-
-
-
-
-
-

Actions préventives & bonnes pratiques

-
-
-
-
-
-
-
-