



1. Entretien initial

En amont de l'entretien initial, le pharmacien procède à l'**analyse des interactions** entre la thérapie anticancéreuse du patient et l'ensemble de ses traitements. Il prépare un **plan de prise personnalisé**. Il lui appartient également de s'approprier les questions des grilles d'entretien présentes dans les fiches de suivi.

Lors de l'entretien initial, le pharmacien adopte une posture d'écoute et d'accompagnement pertinente, adaptée aux besoins du patient ; il utilise un langage adéquat.

Il recueille les informations générales relatives au patient et évalue ses connaissances vis-à-vis du traitement, notamment au regard des informations qu'il a reçues du médecin. Il renouvelle son analyse en tenant compte du régime alimentaire du patient, de son recours à l'automédication, à l'homéopathie, aux compléments alimentaires, aux huiles essentielles (aromathérapie), etc... Il l'informe des modalités de prise de son traitement.

- Le pharmacien évalue la compréhension des informations qu'il délivre à son patient lors des entretiens. Ainsi, le pharmacien considère qu'une notion est :
 - **acquise** dès lors qu'elle est parfaitement intégrée par le patient et que ce dernier est capable de la restituer avec ses propres termes et de la mettre en pratique,
 - **partiellement acquise** dès lors que le patient a des connaissances incomplètes ou imprécises,
 - **non acquise** dès lors que le patient n'a aucune connaissance sur le sujet.
- Le pharmacien propose d'ouvrir au patient, le cas échéant, son dossier pharmaceutique (DP) selon les dispositions réglementaires en vigueur, dans le respect du libre choix du patient d'accepter ou non l'ouverture. **Il rappelle l'utilité du DP et du dossier médical partagé (DMP)** pour détecter d'éventuelles interactions médicamenteuses, optimiser l'analyse des interactions médicamenteuses possibles, coordonner le suivi du patient avec ses prescripteurs, et permettre aux professionnels participant à la prise en soins d'y inscrire les nouvelles prescriptions (DP, DMP) et suivis biologiques (DMP), ce qui favorisera la **transmission** et la **traçabilité des données entre la ville et l'hôpital**. Il est aussi important pour le pharmacien de consulter, lorsqu'ils en ont la possibilité, les documents du parcours de soins du patient contenus dans le dossier communiquant de cancérologie (DCC) : réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) et programme personnalisé de soins (PPS).

BOÎTE À OUTILS



[Bulletin d'adhésion et de désignation du pharmacien](#)



[Fiche médicament VOC Professionnels de santé](#)



[Fiche médicament VOC Patient](#)



1. Entretien initial

Date de l'entretien initial

Nom du pharmacien

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE PATIENT

Nom, Prénom :

Age :

N° Sécurité Sociale :

Régime d'affiliation :

Adresse :

Poids : Taille : Indice de masse corporelle $IMC = \frac{\text{Poids (kg)}}{\text{Taille}^2 \text{ (m)}} :$

Nom du ou des traitements anticancéreux oraux prescrits : Capécitabine (XELODA® ☐ ou générique ☐)

☐ en monothérapie

☐ autre : en association à une chimiothérapie injectable

NB : La mention « Résultat uracilémie pris en compte » doit figurer sur chaque prescription ; s'assurer de sa présence avant toute dispensation.

Autres traitements médicamenteux au long cours :

Autres médicaments / produits consommés par le patient :

☐ Médecines complémentaires (homéopathie, compléments alimentaires, phytothérapie, huiles essentielles ; achats par internet) :

☐ Autres :



1. Entretien initial

Habitudes de vie :

(alimentation, alcool, tabac, activité physique, sport de contact, activité manuelle, déplacement, voyage...)

Allergies et intolérances :

XELODA® et certains génériques de capécitabine contiennent du lactose. Les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit total en lactase ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ne doivent pas prendre ce médicament.

Identification des situations nécessitant assistance (difficultés motrices, sensorielles, cognitives) :

Coordonnées du médecin traitant, de l'oncologue et du service d'oncologie :

Informations reçues concernant l'offre de soins (supports éventuels, dispositif d'annonce de la maladie, échanges avec un professionnel de santé, réseau régional ou territorial de cancérologie, établissement réalisant les soins) :

☐ **Le pharmacien doit rappeler au patient que l'automédication n'est pas recommandée** du fait des interactions médicamenteuses potentielles, et que l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien est nécessaire avant tout nouveau traitement, qu'il soit soumis à prescription ou non.

☐ **Le pharmacien informe également le patient sur les contre-indications** (médicamenteuses, vaccinales, alimentaires). La connaissance des habitudes alimentaires du patient et des comportements de santé (caractéristiques de son régime alimentaire, utilisation de compléments alimentaires, aromathérapie, prise de médicaments dispensés sans ordonnance, etc...) aidera également le pharmacien à prodiguer un conseil adapté.



1. Entretien initial

ÉVALUATION DE L'APPROPRIATION DU TRAITEMENT

À quoi sert votre médicament ?

Traitement du cancer

- ☐ du sein localement avancé ou métastatique, en monothérapie ou en association
- ☐ colorectal, en monothérapie ou en association
- ☐ gastrique, en association

- ☐ A (acquis)
- ☐ PA (partiellement acquis)
- ☐ NA (non acquis)

Le périmètre de remboursement de certaines indications peut varier entre le médicament princeps et ses génériques.

À quelle dose vous a-t-il été prescrit ?

- ☐ A ☐ PA ☐ NA

Quels sont les médicaments à ne pas associer à votre traitement ?

- ☐ A ☐ PA ☐ NA

- Contre-indication aux vaccins vivants atténués (dengue, fièvre jaune, rougeole, oreillons, rubéole, rotavirus, tuberculose, vaccin oral contre la poliomyélite, varicelle, zona) pendant le traitement et jusqu'à 6 mois après son arrêt.
- Topiques gastro-intestinaux : respecter un intervalle minimum de 2h.
- Éviter les médicaments pouvant favoriser les saignements (ex : ibuprofène, aspirine).

Quels sont les aliments/boissons à ne pas associer à votre traitement ?

- ☐ A ☐ PA ☐ NA

- Éviter les produits de phytothérapie pouvant favoriser les saignements.
- D'autres substances présentes dans les plantes, tisanes, huiles essentielles, probiotiques ou compléments alimentaires peuvent interférer avec la capécitabine : vérifier systématiquement leur compatibilité auprès de votre pharmacien.
- Limiter sa consommation d'alcool.

Connaissez-vous la conduite à tenir vis-à-vis de l'emballage vide de votre traitement, voire des éventuels comprimés qu'il vous resterait ?

- ☐ A ☐ PA ☐ NA

À rapporter en pharmacie dans un sachet pour destruction conformément à la procédure en vigueur ; ne pas jeter au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères.

Comment percevez-vous votre pathologie et le traitement que l'on vous a prescrit ?

Quel est votre ressenti par rapport à sa voie d'administration ? Perception possible d'un sentiment d'isolement voire d'abandon du fait d'un encadrement différent de celui d'une chimiothérapie par voie injectable, impression d'efficacité moindre de la forme orale par rapport à une forme injectable.



1. Entretien initial

Votre médecin traitant est-il informé que vous êtes sous anticancéreux oral ?

☐ OUI ☐ NON

Connaissez-vous l'importance de respecter les prescriptions et recommandations de votre médecin (observance) ?

☐ A ☐ PA ☐ NA

L'efficacité optimale du traitement dépend en grande partie de la capacité du patient à bien le suivre. Oublis, décalages du traitement, augmentation ou baisse de la posologie sans avis médical peuvent diminuer l'efficacité du traitement ou majorer les effets indésirables.

Connaissez-vous l'importance de la surveillance de votre traitement ?

☐ A ☐ PA ☐ NA

Elle permet de s'assurer de l'efficacité thérapeutique du traitement et de détecter d'éventuels effets secondaires, parfois source d'ajustement/modification du traitement.

MODALITÉS D'ADMINISTRATION ET PRECAUTIONS GENERALES

Connaissez-vous le schéma de prise de votre traitement ?

☐ A ☐ PA ☐ NA

Traitement en 2 prises par jour :

- ☐ pendant 14 jours puis pause de 7 jours (schéma intermittent, en monothérapie)
- ☐ pendant 14 jours puis pause de 7 jours (schéma intermittent, en association)
- ☐ en continu (en association)
- ☐ en continu pendant la cure de radiothérapie ; 7j/7j (cancer rectal)
- ☐ en discontinu pendant la cure de radiothérapie ; 5j/7j (cancer rectal)

Connaissez-vous les règles de prise de votre médicament ?

☐ A ☐ PA ☐ NA

- Prises à heure fixe (idéalement à 12h d'intervalle), dans les 30 min qui suivent le petit-déjeuner et le dîner, avec un grand verre d'eau.
- Ne pas écraser, mâcher, sucer ou couper les comprimés.
- Toujours se laver les mains à l'eau savonneuse avant et après manipulation de ces médicaments et après être allé aux toilettes.

Connaissez-vous les règles de conservation de votre médicament ?

☐ A ☐ PA ☐ NA

- Stocker hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux domestiques, à l'écart des autres médicaments du foyer et de toute nourriture.
- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité, à température ne dépassant pas 30°C.
- Ne pas le mettre dans un pilulier ; le conserver dans son emballage d'origine.

Connaissez-vous la conduite à tenir en cas d'oubli ?

☐ A ☐ PA ☐ NA

Ne pas prendre la dose manquée, poursuivre le traitement à l'heure et à la dose habituelles de la prise suivante (ne pas doubler la dose).



1. Entretien initial

Connaissez-vous la conduite à tenir en cas de vomissement ?

☐ A ☐ PA ☐ NA

Ne pas prendre de nouvelle dose, poursuivre le traitement à l'heure et à la dose habituelles de la prise suivante (ne pas doubler la dose).

Connaissez-vous les précautions générales à prendre lors de votre passage aux toilettes ?

☐ A ☐ PA ☐ NA

- Uriner assis sur les toilettes. Rabattre l'abattant avant de tirer la chasse d'eau complètement.
- Se laver les mains à l'eau savonneuse.
- Nettoyer régulièrement le bouton poussoir de la chasse d'eau, la cuvette, la lunette et l'abattant des toilettes ainsi que le sol.

Connaissez-vous les précautions générales à prendre lorsque du linge (vêtement, drap) est souillé par un liquide corporel ou des sécrétions (vomissement, sang, urine, sperme, selles) ?

☐ A ☐ PA ☐ NA

- Laver le linge souillé immédiatement et séparément à température élevée (60-90°C).
- Se laver les mains à l'eau savonneuse après contact.

Connaissez-vous les précautions à prendre en cas de relations sexuelles ?

☐ A ☐ PA ☐ NA

- Patiente en âge de procréer : utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement et durant les 6 mois qui suivent la dernière prise de capécitabine.
- Patient masculin : en cas de rapport sexuel avec une partenaire féminine en âge de procréer, utiliser un moyen de contraception efficace pendant le traitement et durant les 3 mois qui suivent la dernière prise de capécitabine.



1. Entretien initial

CONCLUSION POUR LE PATIENT

Avez-vous des questions ? Si oui, lesquelles ?



1. Entretien initial

SYNTHÈSE

Entretien du : Durée (approximative) :

- **INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE PATIENT**
- **ÉVALUATION DE L'APPROPRIATION DU TRAITEMENT** (ressenti et connaissances)
- **MODALITÉS D'ADMINISTRATION** (schéma et règles de prise, conservation, conduite à tenir en cas d'oubli / vomissement) **ET PRECAUTIONS GENERALES**

Appréciation du pharmacien sur le niveau d'information du patient

Prévoir la présence d'un accompagnant pour l'entretien suivant ? ☐ OUI ☐ NON

Prévoir l'orientation du patient vers le prescripteur ? ☐ OUI ☐ NON

Prévoir une prise de contact avec le prescripteur ? ☐ OUI ☐ NON

☐ Le prochain entretien abordera le thème « **Vie quotidienne et gestion des effets indésirables** » et aura lieu le : (en cas de survenue précoce d'effets indésirables, ce rendez-vous peut être avancé).



Lors de cet entretien, le pharmacien évoque avec le patient les difficultés qu'il rencontre dans sa vie quotidienne en lien avec son traitement, ainsi que les éventuels effets indésirables auxquels il est confronté ; il s'agit d'un entretien thématique consacré à la vie quotidienne du patient et aux effets secondaires qu'il rencontre.

Fiche médicament VOC

Patient

☐ A ☐ PA ☐ NA

- Boire 2L d'eau par jour.
- Limiter sa consommation d'alcool.
- Ne pas s'exposer au soleil.
- Prendre **Capécitabine (XELODA® ou générique)** à heure fixe (idéalement à 12h d'intervalle), dans les 30 min qui suivent le petit-déjeuner et le dîner, avec un grand verre d'eau.
- Ne pas écraser, mâcher, sucer ou couper les comprimés.
- Toujours se laver les mains à l'eau savonneuse avant et après manipulation de ces médicaments et après être allé aux toilettes.
- Ne jamais prendre de médicaments / produits d'automédication sans consulter son médecin ou demander l'avis de son pharmacien.
- Topiques gastro-intestinaux : respecter un intervalle minimum de 2h.
- Eviter les médicaments (ex : ibuprofène, aspirine) et produits de phytothérapie pouvant favoriser les saignements.
- D'autres substances présentes dans les plantes, tisanes, huiles essentielles, probiotiques ou compléments alimentaires peuvent interférer avec la capécitabine : vérifier systématiquement leur compatibilité auprès de votre pharmacien.
- Limiter sa consommation d'alcool.
- Contre-indication aux vaccins vivants atténués (dengue, fièvre jaune, rougeole, oreillons, rubéole, rotavirus, tuberculose, vaccin oral contre la poliomyélite, varicelle, zona) pendant le traitement et jusqu'à 6 mois après son arrêt.

Comment vivez-vous votre traitement ?



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

Avez-vous des RDV très réguliers avec les services hospitaliers ?

*Le patient a-t-il le sentiment d'être éloigné du monde médical
du fait de la voie d'administration de son traitement ?*

☐ OUI ☐ NON

Ressentez-vous le besoin d'avoir une aide extérieure
(psychologique, aide au quotidien) ?

☐ OUI ☐ NON

EFFETS INDÉSIRABLES (EI) ET IMPACTS

Avez-vous ressenti un EI qui serait lié à votre traitement ? Une interruption ou un arrêt du traitement doit être envisagé(e) chez les patients présentant une toxicité de grade 2 ou plus (classification NCI-CTCAE ; § 4.2 RCP).

• Nausées

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : Perte d'appétit
- ☐ Grade 2 : Baisse des prises alimentaires sans perte significative de poids
- ☐ Grade 3 : Apport calorique oral et apport hydrique insuffisants

• Vomissements

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : 1 - 2 épisodes (espacés de 5 minutes) en 24 h
- ☐ Grade 2 : 3 - 5 épisodes (espacés de 5 minutes) en 24 h
- ☐ Grade 3 : ≥ 6 épisodes (espacés de 5 minutes) en 24 h

• Sécheresse buccale

- ☐ Non
- ☐ Oui

• Déshydratation

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : Nécessitant une augmentation des apports liquidiens oraux ; sécheresse des muqueuses
- ☐ Grade 2 : Nécessitant une réhydratation par perfusion pendant moins de 24 h
- ☐ Grade 3 : Nécessitant une réhydratation par perfusion ou une hospitalisation

• Perte de poids

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : 5 - 10% de la valeur de base ; ne nécessitant aucun traitement
- ☐ Grade 2 : 10 - 20% de la valeur de base ; nécessitant un support nutritionnel
- ☐ Grade 3 : ≥ 20 % de la valeur de base ; nécessitant une sonde de nutrition entérale / nutrition parentérale

• Anorexie

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : Perte d'appétit mais sans modification des habitudes alimentaires
- ☐ Grade 2 : Prise alimentaire altérée sans perte de poids significative ; supplémentation nutritionnelle orale
- ☐ Grade 3 : Perte de poids significative ou malnutrition (ex : apport calorique ou liquidien insuffisant)

• Dysphagie (difficulté à la déglutition)

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : Symptomatique, alimentation normale
- ☐ Grade 2 : Symptomatique et troubles pour manger / déglutir
- ☐ Grade 3 : Troubles sévères ; nécessitant une sonde de nutrition entérale / nutrition parentérale totale



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

- **Dysgueusie**

- ☐ Non
- ☐ *Grade 1* : Trouble du goût sans modification du régime alimentaire
- ☐ *Grade 2* : Trouble du goût et modification du régime alimentaire (*supplémentation orale*) ; perte du goût

- **Dyspepsie** (*inconfort souvent douloureux de l'estomac résultant de troubles digestifs*)

- ☐ Non
- ☐ *Grade 1* : Symptômes légers ; ne nécessitant aucun traitement
- ☐ *Grade 2* : Symptômes modérés ; nécessitant un traitement médical
- ☐ *Grade 3* : Symptômes sévères ; intervention chirurgicale requise

- **Reflux gastro-œsophagien**

- ☐ Non
- ☐ *Grade 1* : Symptômes légers ; ne nécessitant aucun traitement
- ☐ *Grade 2* : Symptômes modérés ; nécessitant un traitement médical

- **Œsophagite**

- ☐ Non
- ☐ *Grade 2* : Symptomatique ; troubles pour manger / déglutir ; nécessitant une supplémentation orale
- ☐ *Grade 3* : Troubles sévères pour manger ; nécessitant une sonde de nutrition entérale / nutrition parentérale

- **Gastrite**

- ☐ Non
- ☐ Oui

- **Mucite** (*inflammation des muqueuses digestives ; symptôme de surdosage*)

- ☐ Non
- ☐ *Grade 1* : Erythème, sensation désagréable ; alimentation normale
- ☐ *Grade 2* : Erythème, ulcère, douleur modérée ; alimentation solide possible
- ☐ *Grade 3* : Ulcère, douleur sévère ; alimentation liquide seule possible

- **Stomatite** (*inflammation de la muqueuse buccale*)

- ☐ Non
- ☐ Oui

- **Diarrhée**

- ☐ Non
- ☐ *Grade 1* : Augmentation de 1 à 4 du nombre de selles par jour par rapport à l'état initial
- ☐ *Grade 2* : Augmentation de 4 à 6 du nombre de selles par jour par rapport à l'état initial
- ☐ *Grade 3* : Augmentation de 7 ou plus du nombre de selles par jour par rapport à l'état initial

- **Constipation**

- ☐ Non
- ☐ *Grade 1* : Symptômes occasionnels ou intermittents
- ☐ *Grade 2* : Symptômes persistants avec utilisation régulière de laxatifs ou de lavements
- ☐ *Grade 3* : Constipation opiniâtre avec nécessité d'évacuation manuelle

- **Douleurs abdominales**

- ☐ Non
- ☐ *Grade 1* : Douleur légère
- ☐ *Grade 2* : Douleur modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
- ☐ *Grade 3* : Douleur sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne

- **Colite**

- ☐ Non
- ☐ *Grade 2* : Douleurs abdominales ; présence de mucus ou de sang dans les selles
- ☐ *Grade 3* : Douleurs abdominales sévères ; modification des habitudes de défécation

- **Flatulence**

- ☐ Non
- ☐ *Grade 1* : Symptômes légers ; ne nécessitant aucun traitement
- ☐ *Grade 2* : Symptômes modérés ; persistants ; conséquences psychosociales



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

- **Hématurie** (*résultat biologique indiquant la présence de sang dans les urines*)
 - ☐ Non
 - ☐ *Grade 2* : Symptomatique ; nécessitant une sonde urinaire ou un drainage vésical
 - ☐ *Grade 3* : Hématurie macroscopique ; nécessitant une transfusion, un traitement IV ou une hospitalisation
- **Arthralgie**
 - ☐ Non
 - ☐ *Grade 1* : Douleur légère
 - ☐ *Grade 2* : Douleur modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
 - ☐ *Grade 3* : Douleur sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne
- **Douleur osseuse**
 - ☐ Non
 - ☐ *Grade 1* : Douleur légère
 - ☐ *Grade 2* : Douleur modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
 - ☐ *Grade 3* : Douleur sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne
- **Douleur dorsale**
 - ☐ Non
 - ☐ Oui
- **Myalgie**
 - ☐ Non
 - ☐ *Grade 1* : Douleur légère
 - ☐ *Grade 2* : Douleur modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
 - ☐ *Grade 3* : Douleur sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne
- **Faiblesse musculaire**
 - ☐ Non
 - ☐ *Grade 1* : Symptomatique ; faiblesse perçue par le patient mais non évidente à l'examen physique
 - ☐ *Grade 2* : Faiblesse retrouvée à l'examen, interférant avec les activités instrumentales du quotidien
 - ☐ *Grade 3* : Interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne ; invalidant
- **Spasmes musculaires**
 - ☐ Non
 - ☐ Oui
- **Ataxie** (*manque de coordination des mouvements musculaires avec difficultés ou incapacité à accomplir des mouvements volontaires*)
 - ☐ Non
 - ☐ *Grade 2* : Symptômes modérés ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
 - ☐ *Grade 3* : Symptômes sévères ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne
- **Douleur des extrémités**
 - ☐ Non
 - ☐ *Grade 1* : Douleur légère
 - ☐ *Grade 2* : Douleur modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
 - ☐ *Grade 3* : Douleur sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne
- **Dysesthésie**
 - ☐ Non
 - ☐ *Grade 1* : Léger trouble de la sensibilité
 - ☐ *Grade 2* : Trouble modéré de la sensibilité
 - ☐ *Grade 3* : Trouble de la sensibilité sévère
- **Hypoesthésie**
 - ☐ Non
 - ☐ Oui



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

- **Paresthésies** (*picotements, engourdissements, pression, froid ou chaud ressentie sans stimulus*)
 - ☐ Non
 - ☐ Grade 1 : Symptômes légers
 - ☐ Grade 2 : Symptômes modérés ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
 - ☐ Grade 3 : Symptômes sévères ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne
- **Syndrome main-pied** (*rougeur, gêne marquée, gonflement et picotements*)
 - ☐ Non
 - ☐ Grade 1 : Modifications légères de la peau voire érythème, œdème ou hyperkératose ; sans douleur
 - ☐ Grade 2 : Modifications cutanées (*exfoliation, bulles, saignement, œdème, hyperkératose*) avec douleur
 - ☐ Grade 3 : Modifications cutanées sévères avec douleur
- **Affection de l'ongle**
 - ☐ Non
 - ☐ Oui
- **Frissons**
 - ☐ Non
 - ☐ Grade 1 : Sensation légère de froid ; frissons ; claquement des dents
 - ☐ Grade 2 : Tremblements modérés de l'ensemble du corps ; nécessitant un traitement par morphiniques
 - ☐ Grade 3 : Sévère ou prolongé ne répondant pas au traitement par morphiniques
- **Neuropathie périphérique**
 - ☐ Non
 - ☐ Grade 2 : Douleur modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
 - ☐ Grade 3 : Douleur sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne
- **Eruption cutanée** (*apparition de tâches ou d'éléments figurés*)
 - ☐ Non
 - ☐ Oui
- **Erythème** (*rougeur des téguments disparaissant à la pression*)
 - ☐ Non
 - ☐ Oui
- **Photosensibilité**
 - ☐ Non
 - ☐ Grade 1 : Érythème indolore et couvrant < 10 % de la surface corporelle
 - ☐ Grade 2 : Érythème sensible et couvrant 10 – 30 % de la surface corporelle
 - ☐ Grade 3 : Érythème couvrant > 30 % de la surface corporelle et érythème avec bulles
- **Urticaire** (*éruption cutanée prurigineuse avec des papules à intérieur pâle et bords rouges bien marqués*)
 - ☐ Non
 - ☐ Grade 1 : Lésions couvrant < 10 % de la surface corporelle ; nécessitant un traitement topique
 - ☐ Grade 2 : Lésions couvrant 10 – 30 % de la surface corporelle ; nécessitant un traitement oral
 - ☐ Grade 3 : Lésions couvrant > 30 % de la surface corporelle ; nécessitant un traitement IV
- **Prurit**
 - ☐ Non
 - ☐ Grade 1 : Léger ou localisé ; nécessitant un traitement topique
 - ☐ Grade 2 : Intense ou étendu ; intermittent ; lésions de grattage ; nécessitant un traitement oral
 - ☐ Grade 3 : Constant ; nécessitant un traitement par corticoïdes per os ou immunosuppresseur
- **Sécheresse cutanée**
 - ☐ Non
 - ☐ Grade 1 : Couvrant < 10% de la surface corporelle, sans érythème ni prurit
 - ☐ Grade 2 : Couvrant 10 - 30% de la surface corporelle et associée avec un érythème ou un prurit
 - ☐ Grade 3 : Couvrant > 30% de la surface corporelle et associée avec un érythème ou un prurit
- **Membre chaud/douloureux/rouge** (*signe d'alerte d'un évènement thromboembolique, associé à une dyspnée brutale*)
 - ☐ Non
 - ☐ Oui



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

• Hyperpigmentation cutanée

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : Hyperpigmentation couvrant < 10 % de la surface corporelle ; pas d'impact psychosocial
- ☐ Grade 2 : Hyperpigmentation couvrant > 10 % de la surface corporelle ; impact psychosocial

• Trouble de la pigmentation cutanée

- ☐ Non
- ☐ Oui

• Alopécie

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : Perte des cheveux ≥ 50%, non visible à distance mais visible de près
- ☐ Grade 2 : Perte de cheveux > 50%, visible

• Inflammation des muqueuses

- ☐ Non
- ☐ Oui

• Œdème des membres inférieurs

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : Léger gonflement
- ☐ Grade 2 : Modification franche du contour anatomique habituel
- ☐ Grade 3 : Déviation macroscopique des contours anatomiques habituels

• Œdème périphérique

- ☐ Non
- ☐ Oui

• Hypertension

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : Pré-hypertension (PA systolique 120-139 mm Hg ou PA diastolique 80-89 mm Hg)
- ☐ Grade 2 : PAS 140-159 mm Hg ou PAD 90-99 mm Hg ; nécessitant un traitement médical
- ☐ Grade 3 : PAS ≥ 160 mm Hg ou PAD ≥ 100 mm Hg ; nécessitant un traitement médical plus intensif

• Hypotension

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : Asymptomatique, ne nécessitant aucun traitement
- ☐ Grade 2 : Prise en charge médicale non urgente
- ☐ Grade 3 : Nécessitant une prise en charge médicale ou hospitalisation

• Bouffée congestive (flush)

- ☐ Non
- ☐ Grade 2 : Symptômes modérés ; nécessitant un traitement médical
- ☐ Grade 3 : Symptomatique, associé à une hypotension et/ou à une tachycardie

• Palpitations

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : Symptômes légers ; ne nécessitant aucun traitement
- ☐ Grade 2 : Nécessitant un traitement

• Tachycardie

- ☐ Non
- ☐ Oui

• Hyperhidrose

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : Limitée à un site (paumes des mains, plantes des pieds, aisselles)
- ☐ Grade 2 : Concernant plus d'un site ; associée à un impact psychosocial
- ☐ Grade 3 : Généralisé, affecte d'autres sites que les paumes, les plantes ou les aisselles

• Sueurs nocturnes

- ☐ Non
- ☐ Oui



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

• Anxiété

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : Symptômes légers ; ne nécessitant aucun traitement
- ☐ Grade 2 : Symptômes modérés
- ☐ Grade 3 : Symptômes sévères ; pas d'hospitalisation requise

• Insomnie

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : Difficulté légère à l'endormissement ou au maintien du sommeil ou réveil précoce
- ☐ Grade 2 : Difficulté modérée à l'endormissement ou au maintien du sommeil ou réveil précoce
- ☐ Grade 3 : Difficulté sévère à l'endormissement ou au maintien du sommeil ou réveil précoce

• Dépression (*sentiment mélancolique de chagrin ou de malheur*)

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : Symptômes dépressifs légers
- ☐ Grade 2 : Symptômes dépressifs
- ☐ Grade 3 : Symptômes dépressifs sévères ; hospitalisation non requise

• Fatigue

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : Cédant avec le repos
- ☐ Grade 2 : Ne cédant pas avec le repos ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
- ☐ Grade 3 : Ne cédant pas avec le repos ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne

• Léthargie

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : Symptômes légers ; diminution de la vigilance et du niveau de conscience
- ☐ Grade 2 : Symptômes modérés ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne

• Maux de tête

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : Douleur légère
- ☐ Grade 2 : Douleur modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
- ☐ Grade 3 : Douleur sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne

• Malaise

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : Malaise ou sensation de mal-être
- ☐ Grade 2 : Malaise ou sensation de mal-être ; interférant avec les activités instrumentales de la vie

• Vertiges

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : Symptômes légers
- ☐ Grade 2 : Symptômes modérés ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
- ☐ Grade 3 : Symptômes sévères ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne

• Confusion

- ☐ Non
- ☐ Grade 1 : Désorientation légère
- ☐ Grade 2 : Désorientation modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
- ☐ Grade 3 : Désorientation sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne

• Sécheresse oculaire

- ☐ Non
- ☐ Grade 2 : Symptomatique ; nécessitant un traitement par plusieurs produits
- ☐ Grade 3 : Diminution de l'acuité visuelle (< 5/10)

• Irritation oculaire

- ☐ Non
- ☐ Oui



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

- **Larmoiement**

- ☐ Non
- ☐ Oui

- **Conjonctivite**

- ☐ Non
- ☐ *Grade 1* : Asymptomatique ou symptômes légers ; ne nécessitant aucun traitement
- ☐ *Grade 2* : Symptomatique ; nécessitant un traitement topique (ex : antibiotiques)
- ☐ *Grade 3* : Interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne

- **Vision floue**

- ☐ Non
- ☐ Oui

- **Trouble de la mémoire**

- ☐ Non
- ☐ *Grade 1* : Légère ; perte transitoire de la mémoire
- ☐ *Grade 2* : Modérée ; perte de la mémoire à court terme
- ☐ *Grade 3* : Sévère ; perte de la mémoire à long terme

- **Acouphènes**

- ☐ Non
- ☐ *Grade 1* : Symptômes légers ; ne nécessitant aucun traitement
- ☐ *Grade 2* : Symptômes modérés ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
- ☐ *Grade 3* : Symptômes sévères ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne

- **Douleur pharyngolaryngée**

- ☐ Non
- ☐ Oui

- **Bouffées de chaleur**

- ☐ Non
- ☐ *Grade 1* : Symptômes légers ; ne nécessitant aucun traitement
- ☐ *Grade 2* : Symptômes modérés ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
- ☐ *Grade 3* : Symptômes sévères ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne

- **Baisse de la libido**

- ☐ Non
- ☐ *Grade 1* : Diminution de l'intérêt pour le sexe ne nuisant pas à la relation du couple
- ☐ *Grade 2* : Diminution de l'intérêt pour le sexe nuisant à la relation du couple

- **Epistaxis**

- ☐ Non
- ☐ *Grade 1* : Symptômes légers ; ne nécessitant aucun traitement
- ☐ *Grade 2* : Symptômes modérés ; nécessitant un traitement médical

- **Hémorragies** (*gastro-intestinale, vaginale*)

- ☐ Non
- ☐ Oui

- **Epistaxis**

- ☐ Non
- ☐ *Grade 1* : Symptômes légers ; ne nécessitant aucun traitement
- ☐ *Grade 2* : Symptômes modérés ; nécessitant un traitement médical

- **Rhinorrhée**

- ☐ Non
- ☐ Oui

- **Toux**

- ☐ Non
- ☐ *Grade 1* : Symptômes légers ; ne nécessitant aucun traitement
- ☐ *Grade 2* : Symptômes modérés ; nécessitant un traitement
- ☐ *Grade 3* : Symptômes sévères ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

- **Dyspnée**

- ☐ Non
- ☐ *Grade 1* : Essoufflement lors d'un effort modéré
- ☐ *Grade 2* : Essoufflement lors d'un effort minime
- ☐ *Grade 3* : Essoufflement au repos

- **Douleur thoracique**

- ☐ Non
- ☐ *Grade 1* : Douleur légère
- ☐ *Grade 2* : Douleur modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
- ☐ *Grade 3* : Douleur sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne

- **Pyrexie**

- ☐ Non
- ☐ Oui

- **Syndrome pseudo-grippal**

- ☐ Non
- ☐ Oui

- **Infections** (*urinaire, des voies respiratoires basses/supérieures ; herpès, rhinopharyngite, candidose buccale*)

- ☐ Non
- ☐ Oui

- **Autres :**



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

Ces EI perturbent-ils vos capacités physiques (marche, port de charges) ?

☐ OUI ☐ NON

Ces EI ont-ils un impact sur vos activités de loisir et de temps libre ?

☐ OUI ☐ NON

Ces EI ont-ils un impact sur vos tâches quotidiennes ?

☐ OUI ☐ NON

À combien quantifiez-vous votre douleur de 0 à 10 (douleurs ostéoarticulaires, musculaires, neuropathiques) ? [Echelles de mesure de la douleur \(HAS 2020\)](#)

Présentez-vous une modification de votre appétit ?
Si oui, identifiez-vous une cause ?

☐ OUI ☐ NON



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

CONCLUSION POUR LE PATIENT

Avez-vous des questions ? Si oui, lesquelles ?



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

SYNTHÈSE

Entretien du : Durée (approximative) :

- VIE QUOTIDIENNE (difficultés liées au traitement)

- EFFETS INDESIRABLES ET IMPACTS

Appréciation du pharmacien sur le niveau d'information du patient

Prévoir la présence d'un accompagnant pour l'entretien suivant ?

☐ OUI ☐ NON

Prévoir l'orientation du patient vers le prescripteur ?

☐ OUI ☐ NON

Prévoir une prise de contact avec le prescripteur ?

☐ OUI ☐ NON

☐ Le cas échéant, déclarer les EI sur le portail : [signalement-sante-gouv.fr](https://signalement-sante.gouv.fr)

☐ Le prochain entretien abordera le thème « **Observance** » et aura lieu le :



OUTILS





3. Entretien « Observance »

Questionnaire de GIRERD

A. Ce matin, avez-vous oublié de prendre votre médicament ?

☐ OUI = 0 ☐ NON = 1

B. Depuis la dernière consultation, avez-vous été en panne de médicament ?

☐ OUI = 0 ☐ NON = 1

C. Vous est-il arrivé de prendre votre traitement avec retard par rapport à l'heure habituelle ?

☐ OUI = 0 ☐ NON = 1

D. Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains jours, votre mémoire vous fait défaut ?

☐ OUI = 0 ☐ NON = 1

E. Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains jours, vous avez l'impression que votre traitement vous fait plus de mal que de bien ?

☐ OUI = 0 ☐ NON = 1

F. Pensez-vous que vous avez trop de comprimés à prendre ?

☐ OUI = 0 ☐ NON = 1

Score d'observance :

= 6 bonne observance
= 4-5 faible observance
≤ 3 non observance

Quelles sont les précautions à prendre lorsque vous allez aux toilettes et en cas de linge souillé par fluide corporel ?

☐ A ☐ PA ☐ NA

- Uriner assis sur les toilettes. Rabattre l'abattant avant de tirer la chasse d'eau complètement.
- Nettoyer régulièrement le bouton poussoir de la chasse d'eau, la cuvette, la lunette et l'abattant des toilettes ainsi que le sol.
- Laver le linge souillé immédiatement et séparément à température élevée (60-90°C).
- Se laver les mains à l'eau savonneuse.

Quelles sont les précautions à prendre en cas de relations sexuelles ?

☐ A ☐ PA ☐ NA

- Patiente en âge de procréer : utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement et durant les 6 mois qui suivent la dernière prise de capécitabine.
- Patient masculin : en cas de rapport sexuel avec une partenaire féminine en âge de procréer, utiliser un moyen de contraception efficace pendant le traitement et durant les 3 mois qui suivent la dernière prise de capécitabine.



3. Entretien « Observance »

CONCLUSION POUR LE PATIENT

Avez-vous des questions ? Si oui, lesquelles ?



Entretien du : Durée (approximative) :

Appréciation du pharmacien sur le niveau d'information du patient

Prévoir la présence d'un accompagnant pour l'entretien suivant ?

☐ OUI ☐ NON

Prévoir l'orientation du patient vers le prescripteur ?

☐ OUI ☐ NON

Prévoir une prise de contact avec le prescripteur ?

☐ OUI ☐ NON

☐ Le prochain entretien abordera le thème de la « **Vie quotidienne et gestion des effets indésirables** » et aura lieu le : _____