



QU'EST-CE QUE VORANIGO® VORASIDÉNIB ?

- Une thérapie ciblée utilisée dans le traitement de certains cancers du cerveau.
- Prescrit et renouvelé par votre médecin hospitalier spécialiste en oncologie ou cancérologie.
- Disponible en pharmacie hospitalière sur présentation de votre ordonnance



Comprimé pelliculé, blanc à blanc cassé, dosé à :

- **10 mg** : rond, portant l'inscription « 10 » sur une face
- **40 mg** : ovale, portant l'inscription « 40 » sur une face



- Conservez à température ambiante, hors de la vue et de la portée des enfants.



- Ne sortez pas les comprimés du flacon pour les mettre dans un pilulier.
- Lavez-vous soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.
- Ne jetez pas les flacons entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien.

COMMENT PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

| | | |
|-----------|-------------|---|
| Quand ? |h..... | = 1 prise par jour, à heure fixe, en dehors d'un repas (ne pas manger au moins 2h avant et 1h après la prise) |
| Comment ? | | Avalez le ou les comprimés entiers, avec de l'eau, chaque jour au même moment de la journée. Ne pas mâcher, ni couper, ni écraser, ni dissoudre. |

Vous pouvez vous aider du **carnet de suivi*** et d'un **calendrier** pour repérer les prises.

N'arrêtez jamais ou ne modifiez jamais le rythme de prise de votre traitement sans l'avis de votre médecin.

Cette fiche n'est pas une ordonnance, référez-vous à votre ordonnance la plus récente.

QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI OU DE VOMISSEMENT ?



- **En cas d'oubli d'une prise de moins de 6h** : prendre la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle. Le noter dans le carnet de suivi*.
- **En cas d'oubli d'une prise de plus de 6h** : ne pas prendre la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, sans la doubler. Le noter dans le carnet de suivi*.
- **En cas de vomissement**, ne prenez pas de nouvelle dose. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, sans la doubler. Pensez à le noter dans votre carnet de suivi*.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS ET/OU VOTRE ALIMENTATION



Vérifiez avec **votre médecin et votre pharmacien** que les médicaments (prescrits ou non) et/ou autres substances (aliments, épices et plantes, **cannabidiol**, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires...) et produits dérivés que vous utilisez sont **compatibles avec votre traitement**. Les molécules qu'ils contiennent, leur dose et leur fréquence de consommation peuvent interagir avec votre traitement et conditionner l'efficacité et la survenue d'effets secondaires.



- Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement **et jusqu'à 3 mois après la dernière prise**.
- Le vorasidénib peut rendre les contraceptifs hormonaux inefficaces.
- Interrompez l'allaitement durant le traitement **et jusqu'à 2 mois après la dernière prise**.

La fertilité des femmes et des hommes peut être affectée pendant le traitement par vorasidénib.

Votre médecin peut vous informer sur la possibilité de conservation du sperme avant l'initiation du traitement.

*Carnet de suivi disponible sur le site www.omedit-fiches-cancer.fr

QUELS EFFETS INDÉSIRABLES PEUVENT SURVENIR AVEC VORANIGO® VORASIDÉNIB ?

Comme tous les médicaments, le vorasidénib peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

| Effets indésirables | Prévention et gestion |
|--|--|
|  Diarrhée | Surveillez votre poids. Buvez des boissons sucrées et/ou salées : eau, thé sucré, sodas, potages. Evitez les eaux riches en magnésium (CONTREX®, HEPAR®), le café, les boissons glacées. Privilégiez une alimentation pauvre en fibres (féculents, carotte, banane) ; évitez les aliments stimulant le transit (laitages, fruits-légumes crus, céréales, aliments gras, épices). Lavez-vous les mains régulièrement. Si fièvre ou symptômes persistants plus de 5 jours, consultez votre médecin. |
|  Saignements inhabituels, hématomes | Utilisez une brosse à dent souple ; évitez l'utilisation d'un thermomètre rectal. Ne prenez ni aspirine, ni anti-inflammatoire (ex : ibuprofène), ni produits de phytothérapie (pouvant favoriser les saignements) sans avis médical. En cas de survenue d'un bleu, appliquez un objet froid (poche de froid ou sac de glace), voire une crème ou un gel adapté (notamment à base d'arnica) si la peau n'est pas lésée. Contactez votre médecin en cas de survenue de petits points rouges sur la peau, d'ecchymoses, de saignements, de présence de sang dans les urines ou les selles. |
|  Saignements de nez | Penchez la tête en avant pendant toute la durée du saignement et mouchez-vous jusqu'à évacuation des caillots. Maintenez une pression sur vos narines pendant 10 min ; des produits hémostatiques peuvent réduire ce temps (mèches à appliquer après 2 min de compression et à laisser en place 30 min). En cas d'écoulement persistant au-delà de 15 min de compression ou en cas de pâleur, palpitation, sueurs ou hypotension : consultez immédiatement. |
|  Toxicité sur le foie | Contactez votre médecin en cas de symptômes évocateurs d'un problème au foie : jaunissement de votre peau ou de la partie blanche de vos yeux, urines foncées, perte d'appétit, douleurs dans le côté supérieur droit de votre ventre et/ou sensation de faiblesse ou de fatigue intense. |
|  Hyperglycémie | Les signes possibles d'une hyperglycémie sont : bouche sèche, soif intense, envie fréquente d'uriner et fatigue. Une surveillance du taux de sucre dans votre sang pourra être réalisée régulièrement. Pratiquez une activité physique régulière et adaptée. Ayez une alimentation équilibrée. Des traitements adaptés pourront vous être prescrits le cas échéant. |
|  Fatigue | Privilégiez une alimentation saine. Limitez l'usage de psychostimulants (ex : café, tabac et alcool). Soyez prudent en cas de conduite automobile. Respectez des temps de repos dans la journée en conservant une activité même modérée. Couchez-vous à heure régulière. |
|  Vertiges | Evitez la consommation d'excitants (café, alcool, tabac). En cas de vertiges, reposez-vous au calme et décomposez vos mouvements. Consultez votre médecin en cas de vertiges persistants, de maux de tête inhabituels, de bourdonnements d'oreille ou de vomissements. |

Seuls certains des effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Vous pouvez également poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : signalement-sante-gouv.fr



Dans tous les cas, pensez à faire pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin.

QUE FAIRE EN CAS DE SURVENUE D'EFFET(S) INDÉSIRABLE(S) ?

- Prenez les médicaments prescrits contre les effets indésirables en respectant les doses.
- Respectez les mesures de prévention.

Contacts utiles :

Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- Jaunissement de votre peau ou de la partie blanche de vos yeux ; urines foncées
- Douleur dans le côté supérieur droit de votre ventre
- Saignements de nez, des gencives, des yeux ; sang dans les urines/selles
- Confusion ou faiblesse musculaire (hypophosphatémie)
- Tout effet indésirable persistant ou s'aggravant



Remarques :
