



1. Entretien initial

En amont de l'entretien initial, le pharmacien procède à l'**analyse des interactions** entre la thérapie anticancéreuse du patient et l'ensemble de ses traitements. Il prépare un **plan de prise personnalisé**. Il lui appartient également de s'approprier les questions des grilles d'entretien présentes dans les fiches de suivi.

Lors de l'entretien initial, le pharmacien adopte une posture d'écoute et d'accompagnement pertinente, adaptée aux besoins du patient ; il utilise un langage adéquat.

Il recueille les informations générales relatives au patient et évalue ses connaissances vis-à-vis du traitement, notamment au regard des informations qu'il a reçues du médecin. Il renouvelle son analyse en tenant compte du régime alimentaire du patient, de son recours à l'automédication, à l'homéopathie, aux compléments alimentaires, aux huiles essentielles (aromathérapie), etc... Il l'informe des modalités de prise de son traitement.

- Le pharmacien évalue la compréhension des informations qu'il délivre à son patient lors des entretiens. Ainsi, le pharmacien considère qu'une notion est :
 - **acquise** dès lors qu'elle est parfaitement intégrée par le patient et que ce dernier est capable de la restituer avec ses propres termes et de la mettre en pratique,
 - **partiellement acquise** dès lors que le patient a des connaissances incomplètes ou imprécises,
 - **non acquise** dès lors que le patient n'a aucune connaissance sur le sujet.
- Le pharmacien propose d'ouvrir au patient, le cas échéant, son dossier pharmaceutique (DP) selon les dispositions réglementaires en vigueur, dans le respect du libre choix du patient d'accepter ou non l'ouverture. **Il rappelle l'utilité du DP et du dossier médical partagé (DMP)** pour détecter d'éventuelles interactions médicamenteuses, optimiser l'analyse des interactions médicamenteuses possibles, coordonner le suivi du patient avec ses prescripteurs, et permettre aux professionnels participant à la prise en soins d'y inscrire les nouvelles prescriptions (DP, DMP) et suivis biologiques (DMP), ce qui favorisera la **transmission** et la **traçabilité des données entre la ville et l'hôpital**. Il est aussi important pour le pharmacien de consulter, lorsqu'ils en ont la possibilité, les documents du parcours de soins du patient contenus dans le dossier communiquant de cancérologie (DCC) : réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) et programme personnalisé de soins (PPS).

BOÎTE À OUTILS



L'Assurance
Maladie

[Bulletin d'adhésion et de désignation
du pharmacien](#)



[Fiche médicament VOC
Professionnels de santé](#)



[Fiche médicament VOC
Patient](#)



1. Entretien initial

Date de l'entretien initial

Nom du pharmacien

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE PATIENT

Nom, Prénom :

Age :

N° Sécurité Sociale :

Régime d'affiliation :

Adresse :

Poids : Taille : Indice de masse corporelle $IMC = \frac{Poids (kg)}{Taille^2 (m)}$:

Nom du ou des traitements anticancéreux oraux prescrits : Fruqintinib FRUZAQLA®

Autres traitements médicamenteux au long cours :

Autres médicaments / produits consommés par le patient :

Médecines complémentaires (homéopathie, compléments alimentaires, phytothérapie, huiles essentielles ; achats par internet) :

Autres :



1. Entretien initial

Habitudes de vie :

(alimentation, alcool, tabac, activité physique, sport de contact, activité manuelle, déplacement, voyage...)

Allergies et intolérances :

Identification des situations nécessitant assistance (difficultés motrices, sensorielles, cognitives) :

Coordonnées du médecin traitant, de l'oncologue et du service d'oncologie :

Informations reçues concernant l'offre de soins (supports éventuels, dispositif d'annonce de la maladie, échanges avec un professionnel de santé, réseau régional ou territorial de cancérologie, établissement réalisant les soins) :

Le pharmacien doit rappeler au patient que l'automédication n'est pas recommandée du fait des interactions médicamenteuses potentielles, et que l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien est nécessaire avant tout nouveau traitement, qu'il soit soumis à prescription ou non.

Le pharmacien informe également le patient sur les contre-indications (médicamenteuses, vaccinales, alimentaires). La connaissance des habitudes alimentaires du patient et des comportements de santé (caractéristiques de son régime alimentaire, utilisation de compléments alimentaires, aromathérapie, prise de médicaments dispensés sans ordonnance, etc...) aidera également le pharmacien à prodiguer un conseil adapté.



1. Entretien initial

ÉVALUATION DE L'APPROPRIATION DU TRAITEMENT

À quoi sert votre médicament ?

Traitement d'un cancer colorectal métastatique (CCRm), en 2^{ème} ligne ou plus, après progression ou intolérance au traitement par trifluridine-tipiracil ou par régorafénib, en monothérapie

- A (acquis)
 PA (partiellement acquis)
 NA (non acquis)

À quelle dose vous a-t-il été prescrit ?

- A PA NA

Quels sont les médicaments à ne pas associer à votre traitement ?

- Vaccins vivants atténués (dengue, fièvre jaune, rougeole, oreillons, rubéole, rotavirus, tuberculose, vaccin oral contre la poliomyélite, varicelle) : avis nécessaire de l'oncologue avant injection (toxicité hématologique du fruquintinib)
- Topiques gastro-intestinaux : respecter un intervalle minimum de 2h.
- Éviter les médicaments pouvant favoriser les saignements (ex : ibuprofène, aspirine).
- Millepertuis : éviter la prise (risque de diminution de l'efficacité du fruquintinib).

- A PA NA

Quels sont les aliments/boissons à ne pas associer à votre traitement ?

- Millepertuis : éviter la prise (risque de diminution de l'efficacité du fruquintinib).
- Éviter les produits de phytothérapie pouvant favoriser les saignements.
- D'autres substances présentes dans les plantes, tisanes, huiles essentielles, probiotiques ou compléments alimentaires peuvent interférer avec le fruquintinib : vérifier systématiquement leur compatibilité auprès de votre pharmacien.
- Limiter sa consommation d'alcool.

- A PA NA

Connaissez-vous la conduite à tenir vis-à-vis de l'emballage vide de votre traitement, voire des éventuelles gélules qu'il vous resterait ?

À rapporter en pharmacie dans un sachet pour destruction conformément à la procédure en vigueur ; ne pas jeter au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères.

- A PA NA

Comment percevez-vous votre pathologie et le traitement que l'on vous a prescrit ?

Quel est votre ressenti par rapport à sa voie d'administration ? Perception possible d'un sentiment d'isolement voire d'abandon du fait d'un encadrement différent de celui d'une chimiothérapie par voie injectable, impression d'efficacité moindre de la forme orale par rapport à une forme injectable.



1. Entretien initial

Votre médecin traitant est-il informé que vous êtes sous anticancéreux oral ?

OUI NON

Connaissez-vous l'importance de respecter les prescriptions et recommandations de votre médecin (observance) ?

A PA NA

L'efficacité optimale du traitement dépend en grande partie de la capacité du patient à bien le suivre. Oublis, décalages du traitement, augmentation ou baisse de la posologie sans avis médical peuvent diminuer l'efficacité du traitement ou majorer les effets indésirables.

Connaissez-vous l'importance de la surveillance de votre traitement ?

A PA NA

Elle permet de s'assurer de l'efficacité thérapeutique du traitement et de détecter d'éventuels effets secondaires, parfois source d'ajustement/modification du traitement.

MODALITÉS D'ADMINISTRATION ET PRECAUTIONS GENERALES

Connaissez-vous le schéma de prise de votre traitement ?

A PA NA

Traitement en discontinu (*pendant 21 jours consécutifs, suivis d'une période sans traitement de 7 jours, soit un cycle complet de 28 jours*), en 1 prise par jour

Connaissez-vous les règles de prise de votre médicament ?

A PA NA

- Prise à heure fixe, avec ou sans nourriture, avec un grand verre d'eau
- Ne pas ouvrir, écraser ou mâcher les gélules.
- Toujours se laver les mains à l'eau savonneuse avant et après manipulation de ces médicaments et après être allé aux toilettes.

Connaissez-vous les règles de conservation de votre médicament ?

A PA NA

- Stocker hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux domestiques, à l'écart des autres médicaments du foyer et de toute nourriture.
- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité, à température ambiante.
- Ne pas le mettre dans un pilulier ; le conserver dans son emballage d'origine.

Connaissez-vous la conduite à tenir en cas d'oubli ?

A PA NA

Prendre la dose oubliée dès que possible dans l'intervalle des 12 heures post-oubli ; dans le cas contraire, ne pas prendre la dose manquée et poursuivre le traitement à l'heure et à la dose habituelles de la prise suivante (ne pas doubler la dose).

Connaissez-vous la conduite à tenir en cas de vomissement ?

A PA NA

Ne pas prendre de nouvelle dose, poursuivre le traitement à l'heure et à la dose habituelles de la prise suivante (ne pas doubler la dose).



1. Entretien initial

Connaissez-vous les précautions générales à prendre lors de votre passage aux toilettes ?

A PA NA

- Uriner assis sur les toilettes. Rabattre l'abattant avant de tirer la chasse d'eau complètement.
- Se laver les mains à l'eau savonneuse.
- Nettoyer régulièrement le bouton poussoir de la chasse d'eau, la cuvette, la lunette et l'abattant des toilettes ainsi que le sol.

Connaissez-vous les précautions générales à prendre lorsque du linge (vêtement, drap) est souillé par un liquide corporel ou des sécrétions (vomissement, sang, urine, sperme, selles) ?

A PA NA

- Laver le linge souillé immédiatement et séparément à température élevée (60-90°C).
- Se laver les mains à l'eau savonneuse après contact.

Connaissez-vous les précautions à prendre en cas de relations sexuelles ?

A PA NA

Femme en âge de procréer : utiliser une méthode de contraception effective pendant toute la durée du traitement et au moins durant les 2 semaines qui suivent la dernière prise.



1. Entretien initial

CONCLUSION POUR LE PATIENT

Avez-vous des questions ? Si oui, lesquelles ?



1. Entretien initial

SYNTHÈSE

Entretien du : Durée (approximative) :

- **INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE PATIENT**

- **ÉVALUATION DE L'APPROPRIATION DU TRAITEMENT** (ressenti et connaissances)

- **MODALITÉS D'ADMINISTRATION** (schéma et règles de prise, conservation, conduite à tenir en cas d'oubli / vomissement) **ET PRECAUTIONS GENERALES**

Appréciation du pharmacien sur le niveau d'information du patient

Prévoir la présence d'un accompagnant pour l'entretien suivant ? OUI NON

Prévoir l'orientation du patient vers le prescripteur ? OUI NON

Prévoir une prise de contact avec le prescripteur ? OUI NON

Le prochain entretien abordera le thème « **Vie quotidienne et gestion des effets indésirables** » et aura lieu le : (en cas de survenue précoce d'effets indésirables, ce rendez-vous peut être avancé).



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

Avez-vous des RDV très réguliers avec les services hospitaliers ?

Le patient a-t-il le sentiment d'être éloigné du monde médical du fait de la voie d'administration de son traitement ?

OUI NON

Ressentez-vous le besoin d'avoir une aide extérieure
(psychologique, aide au quotidien) ?

OUI NON

EFFETS INDÉSIRABLES (EI) ET IMPACTS

Avez-vous ressenti un EI qui serait lié à votre traitement ? Une interruption ou un arrêt du traitement doit être envisagé(e) chez les patients présentant une toxicité de grade 2 ou plus (classification NCI-CTCAE ; § 4.2 RCP).

• Nausées

- Non
- Grade 1 : Perte d'appétit
- Grade 2 : Baisse des prises alimentaires sans perte significative de poids
- Grade 3 : Apport calorique oral et apport hydrique insuffisants

• Vomissements

- Non
- Grade 1 : 1 - 2 épisodes (espacés de 5 minutes) en 24 h
- Grade 2 : 3 - 5 épisodes (espacés de 5 minutes) en 24 h
- Grade 3 : ≥ 6 épisodes (espacés de 5 minutes) en 24 h

• Perte de poids

- Non
- Grade 1 : 5 - 10% de la valeur de base ; ne nécessitant aucun traitement
- Grade 2 : 10 - 20% de la valeur de base ; nécessitant un support nutritionnel
- Grade 3 : ≥ 20 % de la valeur de base ; nécessitant une sonde de nutrition entérale / nutrition parentérale

• Prise de poids

- Non
- Grade 1 : 5 - 10% de la valeur de base
- Grade 2 : 10 - 20% de la valeur de base
- Grade 3 : ≥ 20 % de la valeur de base

• Anorexie

- Non
- Grade 1 : Perte d'appétit mais sans modification des habitudes alimentaires
- Grade 2 : Prise alimentaire altérée sans perte de poids significative ; supplémentation nutritionnelle orale
- Grade 3 : Perte de poids significative ou malnutrition (ex : apport calorique ou liquidien insuffisant)

• Stomatite (inflammation de la muqueuse buccale)

- Non
- Oui

• Diarrhée

- Non
- Grade 1 : Augmentation de 1 à 4 du nombre de selles par jour par rapport à l'état initial
- Grade 2 : Augmentation de 4 à 6 du nombre de selles par jour par rapport à l'état initial
- Grade 3 : Augmentation de 7 ou plus du nombre de selles par jour par rapport à l'état initial



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

• Douleurs abdominales

- Non
- Grade 1* : Douleur légère
- Grade 2* : Douleur modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
- Grade 3* : Douleur sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne

• Colite

- Non
- Grade 2* : Douleurs abdominales ; présence de mucus ou de sang dans les selles
- Grade 3* : Douleurs abdominales sévères ; modification des habitudes de défécation

• Atteinte rénale

- Non
- Oui

• Arthralgie

- Non
- Grade 1* : Douleur légère
- Grade 2* : Douleur modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
- Grade 3* : Douleur sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne

• Douleur osseuse

- Non
- Grade 1* : Douleur légère
- Grade 2* : Douleur modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
- Grade 3* : Douleur sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne

• Douleur musculosquelettique

- Non
- Oui

• Faiblesse

- Non
- Oui

• Spasmes musculaires

- Non
- Oui

• Douleur des extrémités

- Non
- Grade 1* : Douleur légère
- Grade 2* : Douleur modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
- Grade 3* : Douleur sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne

• Syndrome main-pied (*rougeur, gêne marquée, gonflement et picotements*)

- Non
- Grade 1* : Modifications légères de la peau voire érythème, œdème ou hyperkératose ; sans douleur
- Grade 2* : Modifications cutanées (*exfoliation, bulles, saignement, œdème, hyperkératose*) avec douleur
- Grade 3* : Modifications cutanées sévères avec douleur

• Convulsions

- Non
- Grade 1* : Crise partielle brève ; pas de perte de connaissance
- Grade 2* : Crise généralisée brève
- Grade 3* : Convulsions répétées malgré un traitement médical

• Eruption cutanée (*apparition de taches ou d'éléments figurés*)

- Non
- Oui

• Rash (*éruption transitoire*)

- Non
- Oui



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

- **Erythème** (*rougeur des téguments disparaissant à la pression*)
 - Non
 - Oui
- **Membre chaud/douloureux/rouge** (*signe d'alerte d'un évènement thromboembolique, associé à une dyspnée brutale*)
 - Non
 - Oui
- **Modification des cheveux/poils**
 - Non
 - Oui
- **Inflammation des muqueuses**
 - Non
 - Oui
- **Hypertension**
 - Non
 - Grade 1* : Pré-hypertension (PA systolique 120-139 mm Hg ou PA diastolique 80-89 mm Hg)
 - Grade 2* : PAS 140-159 mm Hg ou PAD 90-99 mm Hg ; nécessitant un traitement médical
 - Grade 3* : PAS \geq 160 mm Hg ou PAD \geq 100 mm Hg ; nécessitant un traitement médical plus intensif
- **Fatigue**
 - Non
 - Grade 1* : Cédant avec le repos
 - Grade 2* : Ne cédant pas avec le repos ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
 - Grade 3* : Ne cédant pas avec le repos ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne
- **Léthargie**
 - Non
 - Grade 1* : Symptômes légers ; diminution de la vigilance et du niveau de conscience
 - Grade 2* : Symptômes modérés ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
- **Maux de tête**
 - Non
 - Grade 1* : Douleur légère
 - Grade 2* : Douleur modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
 - Grade 3* : Douleur sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne
- **Etourdissements**
 - Non
 - Oui
- **Vertiges**
 - Non
 - Grade 1* : Symptômes légers
 - Grade 2* : Symptômes modérés ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
 - Grade 3* : Symptômes sévères ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne
- **Confusion**
 - Non
 - Grade 1* : Désorientation légère
 - Grade 2* : Désorientation modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
 - Grade 3* : Désorientation sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne
- **Trouble de la vision**
 - Non
 - Oui



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

- **Trouble de la mémoire**

- Non
- Grade 1* : Légère ; perte transitoire de la mémoire
- Grade 2* : Modérée ; perte de la mémoire à court terme
- Grade 3* : Sévère ; perte de la mémoire à long terme

- **Douleur oropharyngée**

- Non
- Oui

- **Trouble de la voix**

- Non
- Oui

- **Ecchymoses**

- Non
- Oui

- **Epistaxis**

- Non
- Grade 1* : Symptômes légers ; ne nécessitant aucun traitement
- Grade 2* : Symptômes modérés ; nécessitant un traitement médical

- **Saignements/Hémorragies**

- Non
- Oui

- **Sang dans les selles**

- Non
- Oui

- **Sang dans les urines**

- Non
- Oui

- **Sang dans les expectorations**

- Non
- Oui

- **Douleur thoracique**

- Non
- Grade 1* : Douleur légère
- Grade 2* : Douleur modérée ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
- Grade 3* : Douleur sévère ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne

- **Pyrexie**

- Non
- Oui

- **Infections**

- Non
- Oui

- **Réaction allergique**

- Non
- Grade 1* : Bouffée congestive / rash transitoire, fièvre < 38 °C ; ne nécessitant aucun traitement
- Grade 2* : Nécessitant un traitement ; réponse rapide à un traitement symptomatique
- Grade 3* : Réaction prolongée ; nécessitant une hospitalisation en raison de conséquences cliniques



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

- Autres :

Ces EI perturbent-ils vos capacités physiques (marche, port de charges) ?

OUI NON

Ces EI ont-ils un impact sur vos activités de loisir et de temps libre ?

OUI NON

Ces EI ont-ils un impact sur vos tâches quotidiennes ?

OUI NON

À combien quantifiez-vous votre douleur de 0 à 10 (douleurs ostéoarticulaires, musculaires, neuropathiques) ? [Echelles de mesure de la douleur \(HAS 2020\)](#)

Présentez-vous une modification de votre appétit ?
Si oui, identifiez-vous une cause ?

OUI NON



2. Entretien “Vie quotidienne et gestion des effets indésirables”

CONCLUSION POUR LE PATIENT

Avez-vous des questions ? Si oui, lesquelles ?



3. Entretien « Observance »

Questionnaire de GIRERD

A. Ce matin, avez-vous oublié de prendre votre médicament ?

OUI = 0 NON = 1

B. Depuis la dernière consultation, avez-vous été en panne de médicament ?

OUI = 0 NON = 1

C. Vous est-il arrivé de prendre votre traitement avec retard par rapport à l'heure habituelle ?

OUI = 0 NON = 1

D. Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains jours, votre mémoire vous fait défaut ?

OUI = 0 NON = 1

E. Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains jours, vous avez l'impression que votre traitement vous fait plus de mal que de bien ?

OUI = 0 NON = 1

F. Pensez-vous que vous avez trop de gélules à prendre ?

OUI = 0 NON = 1

Score d'observance :

= 6 bonne observance
= 4-5 faible observance
≤ 3 non observance

Quelles sont les précautions à prendre lorsque vous allez aux toilettes et en cas de linge souillé par fluide corporel ?

A PA NA

- Uriner assis sur les toilettes. Rabattre l'abattant avant de tirer la chasse d'eau complètement.
- Nettoyer régulièrement le bouton poussoir de la chasse d'eau, la cuvette, la lunette et l'abattant des toilettes ainsi que le sol.
- Laver le linge souillé immédiatement et séparément à température élevée (60-90°C).
- Se laver les mains à l'eau savonneuse.

Quelles sont les précautions à prendre en cas de relations sexuelles ?

A PA NA

Femme en âge de procréer : utiliser une méthode de contraception effective pendant toute la durée du traitement et au moins durant les 2 semaines qui suivent la dernière prise.



3. Entretien « Observance »

CONCLUSION POUR LE PATIENT

Avez-vous des questions ? Si oui, lesquelles ?



3. Entretien « Observance »

SYNTHÈSE

Entretien du : Durée (approximative) :

Appréciation du pharmacien sur le niveau d'information du patient

Prévoir la présence d'un accompagnant pour l'entretien suivant ? OUI NON

Prévoir l'orientation du patient vers le prescripteur ? OUI NON

Prévoir une prise de contact avec le prescripteur ? OUI NON

Le prochain entretien abordera le thème de la « **Vie quotidienne et gestion des effets indésirables** »
et aura lieu le :